

Shall





~~XXXX 34~~

24.4.

14-20. G. 25

Due breui e facili trattati,
 il primo d'Arithmetica: l'altro di Geometria:
 ne i quali si contengono alcune cose nuoue
 piaceuoli e utili, si a gentilhuomini come ar-
 tegiani. Del Sig. GIO. FRANCESCO
 PEVERONE DI CVNEO.



IN LIONE
 PER GIO. DI TOURNES.
 M. D. LVIII.

Con Priuilegio del Rè.



A L'ECCELL. DOTTOR
DI FILOSOFIA ET ARTI
IL SIG. SPIRITO
MARTINI.



VEL gran Socrate la cui vita e gesti sono la materia di dialogi di Platone, narra nella sua apologia, che mai da la patria sua accetar volse alcuno uffizio publico. Il che faceua egli non per che non l'amasse (quando volse piu tosto morire contra tutte le ragioni che viuere altroue) ma per che conosceua che al regere & gouernar la Repub. gli m'acarebbe il braccio de l'autorita: per il gran numero de corrotti & mal creati cittadini: & volendo nondimeno giouarla si diede ad altro esercizio, che da chi ben lo stimara, fara d'assai migliore reputato: à rispondere, dico à coloro che à dimandarlo andassero. Le cui risposte ancor ch' egli chiamar non le volessi dottrina facendo espressa professione d'ignoranza: erano non di meno ottimi consigli, è santissimi ammaestramenti, e (come mi sarà lecito dire) vera preparazione de la futura materia, d'una desiata Repub. si bene eshortaua i giouani à le virtu. Io che d'affezione verso la patria mia vorrei imitar Socrate, come è il debito: di dottrina so che ne io, ne maggior di me, il potrà aguagliar giamai, non mi piacendo il maneggio Publico non diro già come Socrate per la corrutella di miei cittadini, ma per esser poco conueniente al humor mio: volendo pur dimo-

strarti

strarti qualche segno de l'affezion mia, ho preso il carico di volerti comunicare i bei secreti de l'Arti: e farli tanto chiari con esempi che da ciascuno possino esser intesi. Cominciando principalmente à scriuere de l'Arithmetica quello che piu mi pareua utile e necessario: pensando che in questa arte huopo mèra di cominciare. La quale degnamente è da tutti riputata la prima: sì per la sua certezza di che tiene il primo grado, come per le molte utilità e piaceri che ella à chi se ne diletta apporta. Pero con buona ragione volse Platone che questa fosse la prima che si apparasse à fanciulli, senza la quale era cosa mal ageuole amministrar le cose publiche e priuate, chi non sa che se questa mancasse à noi, restariamo non solo priui de la soaue armonia de la musica: & de la intelligenza de la Geometria & corsi celesti, ma anchor de la vera interpretazion de le sacre leggi ciuili: e come si sapriano i conti di tanti cambij, diuisioni di heredita trebelianiche, fineze d'ori & argenti, de quali si cauano tante utilità? Volendo dunque mandar fuori questo mio sommario di Arithmetica à voi Signor Spirito con diuoto animo mi è parso di consecrarlo: essendo piu tosto fattura vostra che mia. Voi dunque con l'autorità vostra diffendetelo da le calzonnie de le mal-

naggi lingue di quelli che spenti da la malignità ò crassa ignoranza, il vorranno biasmare. Estate sano.

Da Cuneo del

1556.

D. V. S. Gio. Francesco Peuerone.



Io so, benegno lettore, che non poca maraue-
glia ti recarano nel animo queste mie fatiche, veg-
gendo ch'io mi sia mosso à scriuere cose che gia
da molti scienziati huomini sono uscite di mano,
come s'io volessi retessere la tela di Penelope: ma
se col sano occhio de la mente ben risguardi, ve-
drai che hauendo essi scritto lattinamente, non
hano giouato à tutti: Et se pur alcuni si sono ser-
uiti de la toscana lingua, parte di loro non hano
oferuato ordine alcuno, Et parte hano ateso piu à
far conoscere al mondo che sapeuano, che à dar il
modo di apparare da loro: il che veggendo mi so-
no forzato con molti esempij renderti que-
sta utilis. scienza si chiara, e faci-
le che non piu cosa vec-
chia ma nuoua la
giudica-
rai.
Sta sano.





LIBRO PRIMO.



*Et prima che cosa sia Arithmetica & numero
con suoi caratteri.*



Arithmetica si è sciēza de numeri. Et numero è vna moltitudine di vnita congiunte, come due, tre, e quattro, cinque, dicce, vinti. Vnita altro nō è, che il primō numero di qual si voglia cōsa, come vno huomo, vna pietra: Et questa vnita è la radice, & fondamēto d'ogni numero, poi che da essa ne nascono tutti gl' altri. De numeri poi alcuni sono semplici, come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: & altri composti, come 10, 11, 12, & altri simili. De numeri similmente alcuni sono pari, come 2, 4, 6, 8, 16, 20, &c. Altri sono dispari, come 1, 3, 5, 7, 15, 19, &c. I caratteri de numeri con li quali si compone ogni numero sono dicce: cio è nouē li quali significano alcuno numero, come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, & vno che niente significa, saluo acompagnato da qualche altro carattere: & questo si chiama zifra, ò vero nulla, & così si dipinge 0. Il significato de i caratteri si è che 1 vno, & 2 due, 3 tre, 4 quattro, 5 cinque, 6 sei, 7 sette, 8 otto, 9 noue, significa.

De luoghi de numeri & suo valore.

Ogni carattere adunche posto nel primo luogo, non vale piu del suo numero, come 6 sei, & 8 otto. Ma nel secondo luogo

luogo multipliea se stesso diece volte, come 48, quaranta otto, & 56, cinquanta sei. Nel terzo si multiplica cento volte, come 208, ducento otto. Nel quarto mille volte, & così de gl' altri che seguono, sempre moltiplicando per decene, centene & migliaia, come in esempio il valore di questo numero 123456789, si è 123 milioni, 456 millia & 789, sette cēto ottanta noue: Ma per piu breuita vorrei, che quando vorrai saper il valore di vno numero, che di tre, in tre caratteri, gli faceste vno segno, così 123 / 456 / 789. Et per che nel sommare, moltiplicare, & partire bisogna esser pronto quanto faccia 6, volta 7, & 7, volta 9, & altri infiniti numeri: però vorrei che il mio studioso scolare apparasse prima bene impronto le seguenti tauole, le quale ti leuaranno di vna grande fatica.

PRIMA TAVOLA.

1	& 1	fa 2	4	& 4	fa 8
2	1	3	5	4	9
3	1	4	6	4	10
4	1	5	7	4	11
5	1	6	8	4	12
6	1	7	9	4	13
7	1	8	5	5	10
8	1	9	6	5	11
9	1	10	7	5	12
2	2	4	8	5	13
3	2	5	9	5	14
4	2	6	6	6	12
5	2	7	7	6	13
6	2	8	8	6	14
7	2	9	9	6	15
8	2	10	7	7	14
9	2	11	8	7	15
3	3	6	9	7	16
4	3	7	8	8	16
5	3	8	9	8	17
6	3	9	9	9	18
7	3	10	10	10	20
8	3	11			
9	3	12			

SECONDA TAVOLA.

1	fia	1	fa	1	5	fia	5	fa	25
2		2		<u>4</u>	5		6		30
2		3		<u>6</u>	5		7		<u>35</u>
2		4		<u>8</u>	5		8		<u>40</u>
2		5		<u>10</u>	5		9		<u>45</u>
2		6		<u>12</u>	5		10		<u>50</u>
2		7		<u>14</u>	6		6		<u>36</u>
2		8		<u>16</u>	6		7		<u>42</u>
2		9		<u>18</u>	6		8		<u>48</u>
3		3		<u>9</u>	6		9		<u>54</u>
3		4		<u>12</u>	6		10		<u>60</u>
3		5		<u>15</u>	7		7		<u>49</u>
3		6		<u>18</u>	7		8		<u>56</u>
3		7		<u>21</u>	7		9		<u>63</u>
3		8		<u>24</u>	7		10		<u>70</u>
3		9		<u>27</u>	8		8		<u>64</u>
4		4		<u>16</u>	8		9		<u>72</u>
4		5		<u>20</u>	8		10		<u>80</u>
4		6		<u>24</u>	9		9		<u>81</u>
4		7		<u>28</u>	9		10		<u>90</u>
4		8		<u>32</u>	10		10		<u>100</u>
4		9		<u>36</u>					

DEL SOMMARE, PRIMA
regola d'Arithmetica.

Sommare altro non è, che radunare piu numeri infieme, accio si fapia la somma di effi: come se radunarai infieme 5, 6, 27, farano 38. Per voler adunque saper la somma de piu numeri, descriuerai i numeri, ò sia figure di maniera che i numeri, à numeri, & decene, à decene, & centenaia, à centenaia, rispondano per linea dritta, come nel seguente esempio poi vedere.

Esempio del sommare.

Volendo sommare i seguenti numeri 27, prima incon-

746

423

351

minciar

minciarai da l'vltime figure, ò sia ziphre, & dirai 1, & 3, fa quattro, & 6, fa diece, & 7, fa diecisette: così nota 7, sotto la linea, & tieni 1, cio è vna decena, la quale conta hora prima con l'altre, dicendo 1, & 5, fa sei, & 2, fa otto, & 4, duodeci, & 2, fa quatordecì: & nota sotto la linea 4, & tieni ancora vna decena, poi piglia l'altre ziphre seguenti, & dirai vno tengo, & 3, fa quattro, & 4, fa otto, & 7, fa quindecì, & così nota tutti li 15, sotto la linea, per esser l'vltimo numero: come vedi in figura,

$$\begin{array}{r} 27 \\ 746 \\ 423 \\ 351 \\ \hline 1547 \end{array}$$

Esempio di sommare diuerse specie de numeri, come scutti, fiorini di Piemonte, & grossi.

Descritti adunque prima i numeri così,

scutti 29	fiorini 6	grossi 7
47	4	6
65	4	4
83	3	5

Incommenciando similmente da l'vltime ziphre, cio è grossi dirai 5, & 4, fa noue, & 6, fa quindecì, & 7, fa vintidue: pero sapendo che grossi 22, fano 1, fiorino, & grossi dieci, nota sotto la linea 10, & tieni vno fiorino, il quale acompagnato col 3, che seguita, fa quattro, & 4, fa otto, & 4, fa dodeci, & 6, fa diece otto, & per che sai che diece otto fiorini fano scutti 2, & fiorini due, nota i due fiorini sotto la linea dinanzi al 10, & tieni i due scutti, li quali agionti con li vltimi 3 scutti, fano cinque, & 5, fano dieci, & 7, fano diecisette, & 9, fano vintisei, così nota 6, & tieni 2, li quali contati con gl' 8 seguenti fano dieci, & 6, fano sedeci, & 4, fano vinti, & 2, che sono vintidue, li quali nota integramente così, scutti 29 fiorini 6 grossi 7

47	4	6
65	4	4
83	3	5
226	2	10

Che valeno scutti duceto vintisei, & fiorini due, grossi dieci.

b Esemp

Esempio di sommar pesi.

Prima bisogna saper, che oncie 12 fano la liura, & 25 liure fano il rubo. Pero volendo sommarè i seguenti numeri, Rubi 17 liure 15 oncie 10

15	13	9
12	10	7
9	20	3

incominciarai sempre da l'ultima ziphra, & dirai così 3, & 7, fa dieci, & 9, fa dieci noue, & 10, fa vintinoue, per il che caua liure 2, & nota oncie 5, sotto la linea: poi di nuovo dirai 2, tengo, & 3, fano cinque, & 5, fano dieci, così nota 0, & tieni vno, il quale gionto col 2, che seguita fa tre, & 1 fa quattro, & 1 fa cinque, & 1 che fa sei, i quali gionti col 0, fano 60, & per che liure 60, fano rubi 2, & liure 10, nota le liure 10, & tieni li rubi 2, li quali gionti con li 9, fano vndecì, & 2 fa tredici, & 5 fano dieciotto, & 7 fa vnticinque: pero nota gli 5, & tieni le due decene, le quale gionte con l'altre tre che seguono fano 5, li quali finiscono la somma: come qui sotto in esemplo si puo vedere,

R. 17 liure 15 oncie 10

15	13	9
12	10	7
9	20	3

R. 55 liure 10 oncie 5

De i pesi d'oro, & argento.

Per che ti ho detto nel principio, che l'Arithmetica, o sia abbaco è necessario à tutti, ti propongo ancoravn' esemplo, di sommare i pesi di marchio, per vtilità de gl'orefici, & altri che maneghiano oro, & argento. Et prima deui sapere che grani 24, fano vno dinaro, & 3 dinari fano vno otteno: & 8 otteni fano vna oncia, & 8, oncie fano vno marchio. Quanto à le finezze de gl' ori, & argenti, & à quanti caratti, & dinari puono ascendere, & piu altre sutilità che in essi sono, & guadagni, non mi pare cosa hora al proposito di raccontare, forse in altro luogo ne parlaro piu à compimento: solo al presente ti daro vno esemplo de suoi pesi breuemente, dandomi à credere che hauendo bene intesi i già detti esempli

esempi, che facilmente saprai anche sominare questo, incominciando sempre da l'ultime ziphre, come ti ho detto.

Marchi 7 oncie 2 ottieni 7 di. 2 grani 15

5 4 5 1 17

3 6 2 2 13

6 5 1 2 12

Marchi 23 oncie 3 ottieni 2 di. 0 grani 9

DEL SOTTRARE, SECONDA

regola d'Arithmetica.

Sottrare, si è difalcare vno numero da vn' altro maggiore, ò vguale: accio che difalcato l'vno da l'altro, tu sappi, che cosa ti auanza: come se da 36, ne caui 9, ti auanza 27, & cosi de tutti gl'altri. Scriue adunque il minor numero sotto al maggiore, di maniera che le decene, à le decene, per dritta linea si rispondano: & le centanaia, à le centanaia, incominciando da l'ultima ziphre cosi, scutti 30648

283

Dopo caua prima il 3, dal 8, che vi sta sopra & resta à 5, li quali notarai sotto la linea, & per dritta linea del 3, poi dirai, chi di 4, ne caua 8, non puo, pero ti bisogna impremdare vna decena del 6, che seguita: & dirai chi de 10, & 4, che fa quatordecini, ne caua 8, aresta à 6, i quali parimente notarai sotto la linea dinanzi al 5: poi dirai, chi di 5, ne caua 2, resta 3, chi de nulla 0, & chi di 3, caua 0, resta 3, come in figura si vede qua sotto.

scutti 30648 numero principale.

283 numero da sottrare.

30365 restante.

Nota bene ancora il seguente esempio, per che ti accaderà spesso incontrarti in simili conti.

scutti 3002648

23743 numero da sottrare.

2978905 numero che auanza.

Et prima dirai chi d' 8, ne caua 3, auanza 5, & chi de 4, ne caua 4, auanza 0, & chi di 6, ne caua 7, non puo, però bisogna impremdare vna decena dal 2, che gli è auanti, & dirai chi di 10, & 6, che fano 16, ne caua 7, auanza 9, &

b 2 chi

chi di 1, che resta del 2, ne caua 3, non puo: però similmente impremuda dal 0, vna decima, & dirai chi di 11, ne caua 3, auanza 8, & per che il 0, non significa piu si non che 9, dirai chi di 9, ne caua 2, auanza 7, similmente il 0, secondo significa 9, però nota 9. Hora nota bene che hauendo impremutato vna decena sopra li due 0, il 3, che seguita non vale piu si non 2, però nota 2, con tutti gl' altri numeri che ti auanzano sotto la linea, come nel esempio sudetto poi vedere.

Nota ancora che volendo difalcare, ò sottrare piu numeri da uno, à l' hora ti bisogna prima sommare tutti quegli numeri, poi sottrare l'vno da l'altro per la regola sudetta.

La proua.

Se vorrai saper se questa supputazione è giusta, somma il numero da sottrare, & quello che ti auanza insieme, & vedrai che farano vguali.

O vero difalca tutti i noue dal secondo, & terzo numero, & nota il resto, similmente difalca tutti i noue dal primo numero, & trouarai che sarà il restante vguale al numero prima notato, come vedi qua in figura.

$$\begin{array}{r} 1\overline{)5} \\ 4\overline{)5} \end{array}$$

Il secondo numero auanza 1, & il terzo auanza 4, i quali giunti insieme sano 5, & tanto auanza il primo numero: così sarà giusta.

DEL MVLTIPLICARE,
terza regola d'Arithmetica.

Multiplicare si è acrescere, ò aumentare vn' numero per l'altro, il quale tante volta si acreschi, quante sarà il valor del numero che multiplica: come multiplicare 23, per 6; si è acrescere 23, sei volta, che sono poi 138, in somma. Ma per piu intelligenza ti do vn' altro esempio.

Volendo multiplicare  dirai 6, fia 4, fa 24, nota 4,

e tieni 2, poi dirai 6, fia 2, fa 12, & 2, ne tieni che sono 14, li quali nota integramente sotto la linea, poi replica 1, fia

fia 4, fa 4, il quale 4; nota sotto al secondo numero, lasciando adietro vna ziphra, & parimente dirai 1, fia 2, fa 2, & quello nota sotto al 1: apresso somma ambidue i numeri, che di nuouo hai notati, come nel seguente esempio si po vedere,

$$\begin{array}{r} 2 \quad 4 \\ \times \quad \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 6 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 4 \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad 4 \\ \hline \end{array}$$

Somma de $\begin{array}{r} 3 \quad 8 \quad 4 \end{array}$

numero da multiplicare.

numero che multiplica.

numeri de la multiplicazione.

la multiplicazione.

Terzo esempio di tre ziphre contra vna.

Come in esempio volendo multiplicare 500, per 3, multiplica 3, fia 5, fa 15, poi gl'agiongi i due nulla apresso, cosi, 1500, & ritrouarai il numero che cerchi: da questo seguita che ad ogni volta che apresso ad vno numero acrescerai vn' o, quello numero fara multiplicato diece volta, se due 00, cento volta, se tre 000, mille volta, & cosi consequentemente del resto: come 36, per 10, fa 360, & per 100, fa 3600.

Quarto esempio.

Se à caso fossero da multiplicare vn' numero composto, per vn' altro similmente composto: scriue sempre il minor numero sotto al maggiore: come in esempio,

6543 numero che si die multiplicare.

204 numero che multiplica.

Poi multiplica tutte le ziphre di sotto vna per vna con quelle di sopra, notando ogni multiplicazione à parte, & lasciando sempre vna ziphra di quelle di sopra à dietro: poi finalmente somma tutti quelli numeri, che sono usciti de la multiplicazione fatta. Auisandoti che se nel multiplicare si generasse qualche decena, notarai solo il numero semplice infino al fine de la multiplicazione di quella ziphra: & al' hora notarai tutto il numero che ti auanza, & ti do l'esempio sudetto.

b 3

Prima

Prima multiplica da l'ultima ziphra, & dirai 4, fia 3, fa 12, & nota sotto la linea il numero semplice 2, & tieni la decena: poi dirai 4, fia 4, fa 16, & vno ne tieni fa 17, nota il 7, & tieni similmente la decena: incaminando à l'altra ziphra, dirai 4, fia 5, fa 20, & vno tieni fa 21, nota 1, & tieni gli 2: dopo multiplica 4, fia 6, fa 24, & 2, tieni fa 26, li quali integramente nota: finita la ziphra 4, piglia il 0, & per che di niente niente si fa, nota quattro nulla, per che vi sono quattro ziphre nel numero che voi multiplicare. Lasciando pero à dietro sempre vna ziphra, cio è noterai il 0, sotto al 7, & lasciarai à dietro il 2, fatto cio multiplica il resto dicèdo 2, fia 3, fa 6, & 6, nota sotto al secòdo 0, poi multiplica 2, fia 4, fa 8, il quale nota sotto al terzo 0: & dirai 2, fia 5, fa 10, nota 0, & tieni vno: poi dirai 2, fia 6, fa 12, & vno tieni fa 13, li quali nota còpiramente, come ne la seguète descrizione poi vederè: il che fatto, somma tutti quegli numeri de la multiplicazione.

$$\begin{array}{r}
 6543 \\
 204 \\
 \hline
 26172 \\
 0000 \\
 13086 \\
 \hline
 \end{array}$$

Somma de 1334772 la multiplicazione.

Vi è ancora vn'altra sorte di multiplicazione molto bella, & facile à quegli che hano poca memoria: per che non gl'acade tener sempre in memoria le decene. Volendo adunque multiplicare qualche numero, come per esempio; Vno collonello deue pagare 3500 fanti, à ragione de scutti 24 per huomo, & vorrebbe sapere quanti scutti in somma vi bisogna. Fa così prima designerai sopra la carta vna figura di linee drete, con tanti quadrati dentro quante sono le ziphre, ò numeri che si vole multiplicare: & di largo tanti quanti sono i numeri de la multiplicazione, dopo parte ogni quadrato con vna linea à sbiaffo come vedi qua.

3	5	0	0	
				2
				4

Multipl

Moltiplica poi 3500, per li 24, al modo già dettò ne gl' altri esempi: ma auertissi che quiui si incōmincia à moltiplicare dal 2, poi dal 4, & si nota tutti i numeri sotto la linea diagonale, ò vero che sbiaffa: & le decenē si notano sopra di cisa, come col occhio nella presente figura poi vedere.

		3	5	0	0	
		6	1	0	0	
	1	2	2	0	0	
La	8	4	0	0	0	somma.

Nota che volendo sommare i numeri che sono nasciuti da la moltiplicazione, ti bisogna caminare per la linea diagonale, che descende al sbiaffo.

De alcune abreniature ne la moltiplicazione.

Se nel fine de numeri farano vna, ò due & piu nulle, volendo moltiplicarle, taglia via li 0, poi moltiplica i numeri che sono di alcun valore tra loro: il che fatto agiongeli le 0: come in esempio volendo moltiplicare 2500, per 1700, taglia via quatro nulle, & moltiplica 25, per 17, & ne riesse 425, à quali agiongì quatro nulle, & fa in somma 4250000, integro numero de la moltiplicazione di 2500, per 1700.

La proua de la moltiplicazione.

Parti il numero che è nasciuto da la moltiplicazione, per il numero che moltiplica, & ti riescra la proua fatta. Ne bisogna che aspetti da me altra proua, per che tutte l'altre del 9, & 7, sono falaci, & senza alcun fondamento, appara adunque prima à partire, poi saprai far questo proua.

DEL PARTIRE, QVARTA
regola d'Arithmetica.

Partire si è far d'vno numero tante parte quante ne voi: & la sua pratica è questa: prima nota il numero il quale voi partire, poi descriui sotto di esso due linee parallele, & apresso nota il numero partitore chiamato, come veddi qua in figura. 8628 numero che si à da partire.

25 partitore.

Ma

Ma auertiffi che ſel numero partitore, ſoſſi di piu valore del numero che è da partire, nel ſuo principio ti biſogna-
rebbe ſituarlo piu adietro, come queſto, $\overline{8628}$

96

Il che fatto, vedi quante ſiate il partitore entri nel nume-
ro ſopraſcritto, & quelle nota in mezo le due linee, come in
eſempio. Voglio partire 54321 , ſcutti à 60 , ſoldati: prima
nota i numeri come gia di ſopra ti ho detto, poi dirai 6 , in
 54 , entra 9 , volte, però nota il 9 , in mezo le due linee, &
cangella il 54 , & il partitore coſi.

$$\begin{array}{r} 54321 \\ \underline{9} \\ 60 \end{array}$$

Di nuouo muta piu à dietro il partitore, cio è ſotto al 32 ,
& dirai 60 , in 32 , non puo entrare: però ti auifò che ſem-
pre che il partitore non potra entrare, ti biſogna notare un
 0 , & mudare il partitore piu à dietro, come vedi qua.

$$\begin{array}{r} 54321 \\ \underline{90} \\ 600 \end{array}$$

Poi dirai 6 , in 32 , entra 5 , per che 5 , ſia 6 , ſa 30 , & auan-
za 2 , li quali nota di ſopra al 2 , & cangella il 32 , & il parti-
tore, deſcriuendo però il 5 , apreſſo al 0 , in mezo le due li-
nee coſi: & è finito.

$$\begin{array}{r} 54321 \\ \underline{905} \\ 600 \end{array}$$

Hora tu vedi come toca ſcutti 905 , per ogni ſoldato, &
ti auanza $\frac{1}{2}$ de li quali ti diro ne i numeri rotti, come ſi in-
tendano, & quanto vagliano. Al preſente ti darò ancora vno
eſempio per piu intelligenza.

Volendo partire 525600 , parpagiole per farni ſcutti:
& deui ſaper che vno ſcutto vale parpagiole 48 : però de-
ſcriue prima i numeri al modo gia detto, & fa tuo partitore il
 48 , coſi,

$$\begin{array}{r} 525600 \\ \underline{48} \end{array}$$

Et dir

Et dirai 4, in 5, entra vna volta, & auanza 1, pero nota 1, sopra del 5, & similmente 1, in mezo le due linee, & cangella il 5, & il 4, poi replica 1, fia 8, fa 8, chi de 12, ne caua 8, auanza 4, come vedi qua.

$$\begin{array}{r}
 14 \\
 825600 \\
 \hline
 1 \\
 \hline
 8
 \end{array}$$

Di nuouo muta il partitore sotto al 45, & dirai 48, in 45, non puo entrare, però nota in mezo le due linee vn o, per la ragione gia detta di sopra, & cangellato il partitore transferiscilo piu à dietro sotto al 56, & dirai 4, in 45, potrebbe entrare diece volta: ma ti auiso, che mai in qual si voglia numero tu faccia entrare piu di 9, pero dirai 4, in 45, entra 9, volta, per che 4, fia 9, fa 36, & ti auanza 9, il quale nota sopra il 5, poi cangella il 45, & replica 8, fia 9, fa 72, chi di 96, ne caua 72, auanza 24, li quali nota sopra il 96, & cangella il 96, & il partitore cosi.

$$\begin{array}{r}
 2 \\
 4444 \\
 825600 \\
 \hline
 109 \\
 \hline
 8888 \\
 **
 \end{array}$$

Mudato poi il partitore piu adietro, dirai 4, in 24, entra 5, volta per che 4, fia 5, fa 20, & auanza 4: poi replica 5, fia 8, fa 40, per il che nota 5, in mezo le due linee, & cassa il 240, & il partitore cosi.

$$\begin{array}{r}
 2 \\
 444 \\
 825600 \\
 \hline
 1095 \\
 \hline
 8888 \\

 \end{array}$$

Tirato piu adietro il partitore dirai 48, in o, non puo entrare: pero nota un o, apresso al 5, & cangella il partitore: cosi resta compiuto come vedi,

$$\begin{array}{r}
 \text{parpagliole} \quad \begin{array}{r} \text{5} \text{ 2 } \text{5} \text{ 6 } \text{0} \text{ 0} \\ \hline \text{1} \text{ 0 } \text{9} \text{ 5} \text{ 0} \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{numero partito.} \\ \text{numero quozziante.} \end{array} \\
 \text{scutti} \quad \begin{array}{r} \text{5} \text{ 8 } \text{8} \text{ 8} \text{ 8} \text{ 8} \\ \hline \text{5} \text{ 8 } \text{8} \text{ 8} \text{ 8} \text{ 8} \end{array} \quad \text{partitore.}
 \end{array}$$

Così vedi che le 525600, parpagliole fanno scutti 10950, interi, & se qualche numero vi fosse avanzato, farebbono parpagliole.

Di alcune abbreviature.

Accadendoti partire qualche numero per 10, taglia via l'ultima ziphra, & restara partito come in esempio 460/5, tagliato il 5, resta partito per 10. Volendo partire per 100, taglia le due ziphre ultime così 46/05. Volendo partir per 1000, ne taglierai tre: se per 10000, ne taglierai quattro, & così del resto.

La proua del partire.

La proua si fa moltiplicando il quozziante per il partitore, agiongendoui à quella somma il numero che ti è avanzato dal partimento, & ti riescesse la somma del numero che hai partito: come vedi in esempio.

$$\begin{array}{r}
 \text{quozziante} \quad \begin{array}{r} \text{6} \text{ 8 } \text{4} \text{ 3} \\ \hline \text{1} \text{ 3} \text{ 0} \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{partitore} \quad \begin{array}{r} \text{5} \text{ 8 } \text{0} \text{ 0} \\ \hline \text{5} \end{array} \end{array} \\
 \begin{array}{r} \text{6} \text{ 5} \text{ 4} \text{ 3} \end{array} \quad \begin{array}{r} \text{6} \text{ 5} \text{ 0} \text{ 0} \\ \hline \text{4} \text{ 3} \\ \hline \text{6} \text{ 5} \text{ 4} \text{ 3} \end{array} \quad \text{somma.}
 \end{array}$$

Il modo del partire per mita.

Partire per mita, si è far due parti di qual si voglia numero: come in esempio, se voi partire in due parti 67500, dirai, la mita di 67, è 33, & auanza 1. però nota 33, sotto la linea & 1, sopra il 7, cangellando il 67, così,

$$\begin{array}{r}
 \text{1} \\
 \text{6} \text{ 7 } \text{5} \text{ 0} \text{ 0} \\
 \hline \text{3} \text{ 3}
 \end{array}$$

Poi dirai, La mita di 15, si è 7, & auanza similmente 1, però nota il 7, apresso al 33, & 1, sopra il 5, di nuouo replica

plica la mita di 10, si è 5, & nota 5 apresso al 7, così,

$$\begin{array}{r} \times \times \\ 87880 \\ \hline 3375 \end{array}$$

Hora per che ti auanza vn o, dirai la mita di o, sic o, pero nota il o, apreso al 5. Et cio ti sia per regoia, che sempre che ti occorrera qualche nulla nel partir in due parti notrai vn o come vedi in esempio.

$$\begin{array}{r} \times \times \\ 87888 \text{ numero integro.} \\ \hline 33750 \text{ la mita.} \end{array}$$

Et queste sono le quattro regole generali d'Arithmetica, con le quali si opera tutto il resto: Ma prima che piu oltre incaminiamo, nota questa regola generale, che sempre quello che ti auanza da i partimenti, ritieni il nome del suo partitore: come in esempio. Se voi de 203, fiorini di piemonte farni scutti, li quali de l'anno 1554, otto valeno scutto vno: pero parti gli 203, per 8, ne riesce di quoziente scutti 25, & auanzano 3, che si domandano fiorini come ti ho gia detto.

$$\begin{array}{r} * \\ 203 \text{ fiorinì.} \\ \text{scutti } 25 \text{ \& } \frac{1}{8} \text{ cio è tre fiorinì.} \\ 88 \text{ partitore.} \end{array}$$

DE LE PROGRESSIONI.

Progressione non è altro, che vna moltitudine de numeri i quali hano vguale salita l'vno sopra l'altro: come questi 2, 4, 6, 8, 10, che di due in due vano salendo, o vero di tre in tre, o quattro in quattro, qual si voglia: Se adunque vorrai presto sommare vna simile copia de numeri, conta prima il numero de quegli numeri che voi sommare, & notalo: poi congionzi il primo col vltimo, & nota similmente la somma: dopo moltiplica il numero de numeri per il mezo numero de tutti.

*Esempio de numeri dispari, tanto continoui
quanto discontinoui.*

Esempio se voi sommare tutti questi numeri li quali di tre

c 2 in tre:

in tre vano salendo : come 3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , prima conta che sono 7 , numeri in tutto : dopo moltiplica il numero 7 , per il numero mezano de tutti che è 12 , & ne riefce 84 , che farà la fomma intiera. Se à cafo i numeri foſſero pari , come queſti 3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 , che ſono 8 , congionti il primo 3 , col 24 , vltimo fa 27 , il quale moltiplica per il numero de la mita de numeri , che farà 4 , che è la mita de gli 8 , numeri & ne riefce 108 .

De le progrefſioni Geometrice.

Le Geometrice ſono quelle che con certa proporzione vano ſalendo : come in dupla , come queſta 4 , 8 , 16 , ò tripla come 6 , 18 , 54 , & altre ſimili. Et queſte breuemente ſommarai moltiplicando l'vltimo numero col numero de la proporzione , & de la ſomma cauani il primo numero che ſia di vno minore del valor de la proporzione , & il quoziente ti dimoſtrara la ſomma intiera de i numeri : come in eſempio , Vno ti ha promeſſo mediante ſcutti 100 , di dar ti hoggi 1 , ſoldo domani 2 , poſdomani 4 , coſi ogni giorno moltiplicando in dupla , infino al termine di diece giorni. Volendo ſaper quanti ſoldi egli pagarebbe in detto termine di diece giorni : fa coſi notta tutti i numeri di giorni diece coſi per ordine 1 , 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 , 512 , poi moltiplica l'vltimo numero cio è 512 , col numero de la proporzione , che è 2 , ne riefce 1024 , de la qual ſomma cauani il primo numero de la progrefſione che è 1 , ti auanza 1023 , & queſto volendolo partire per vno numero minore di 1 , de la proporzione , ti reſta fatto il partimento : per che la proporzione ſi è 2 , & cauandone 1 , auanza 1 , coſi tu hai la ſomma intiera di diece giorni come vedi qua .

$$\begin{array}{r}
 512 \\
 \underline{2} \\
 1024 \\
 \underline{1} \\
 1023
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1023 \text{ ſomma.} \\
 \underline{1} \\
 1
 \end{array}$$

Ma per che quando foſſero giorni 20 , ò vero 30 , farebbe coſa troppo noioſa notare tanti numeri : ti darò il modo come con breuita lo farai . nota ſolo il numero de giorni ſei coſi

coſi 1, 2, 4, 8, 16, 32, poi moltiplica l'ultimo numero per ſe ſteſſo, cio è 32, per 32, ne rieſce 1024, de la qual ſomma cauani il primo numero de la progrefſione, che è 1, ti ſoprauanza 1023, che farà la ſomma de dicce giorni ingera.

Ma auertiffi che ſe tale progrefſione de numeri non comincia da 1, non biſogna moltiplicare due tali numeri intieri fra loro. Ma prima partire il ſecondo per il primo, & dopo moltiplicare il quoziente ne l'altro. Et cio ti inſegno accio che trouato l'ultimo numero, poſſi facilmente trouare tutta la ſomma ſenza cognizione de i numeri di mezo. Ti biſogna ancora ſaper, che tutte le progrefſioni Geometrice che non cominciano da 1, ſono di poco uſo, per che da quello come radice naſcono tutti gl' altri.

DE LA REGOLA DEL TRE.

Sogliono alcuni innanzi di queſta regola deſcriuere i numeri rotti. Nondimeno à me è parſa conueniente coſa di proporre queſta vtiliſſima regola del tre coſi chiamata, per che da i tre numeri conoſciuti, conoſci dopo il quarto non conoſciuto. Et è molto breue, ma l'uſo ſuo è molto utile ſi in coſe di mercanzia, come ancora in coſe di Geometria: & la ſua pratica è queſta, Moltiplica il terzo numero per quello di mezo, & la ſomma che ne rieſce, partela per il primo: & il ſuo quoziente ti demonſtrara il numero non conoſciuto che cerchi. Come in eſempio, ſe ſcutti 50 hano guadagnato ſcutti 30: & voi ſaper quanti ne guadagnarebbono ſcutti 500: moltiplica 500, per 30, fa 15000: li quali parti per 50, ne rieſce di quoziente ſcutti 300: & tanto ſi guadagnarebbe con li ſcutti 500.

Eſempio quando vi entrano meſi ò vero anni.

Come ſe ſcutti 25, in 4, anni hano guadagnato ſcutti 8, quanti ne guadagnarebbono ſcutti 100, in 10, anni. Dirai per la regola, ſe 25, mi da 8, quanto 100: moltiplica 100, per 8, & parti per 25, ne rieſce 32. Dopo dirai ſe anni 4, mi danno 32, quanti anni 10, moltiplica ſimilmente 32, per 10, fa 320, li quali parte per 4: ne rieſce ſcutti 80. Et tanti ſcutti dico che guadagnarebbono li ſcutti 100, in anni 10.

c 3 La




La sua proua.

Altra piu certa proua non vi è di questa regola del tre, che partire il terzo numero per il primo, poi multiplicare il quoziente per il secondo.

LA REGOLA DEL
tre conuersa.

La pratica di questa regola si è multiplicare il primo numero per il secondo, & partire il quoziente per il terzo. Come se fanti 3000, assediati in vna citta, hauessero vetouaglie per 7 mesi: volendo saper quanti ne bisognarebbe cassare, accio il restante hauesse da viuere per vno anno: multiplica 3000, per 7, fa 21000, li quali partiti per 12, mesi, ne riesse 1750, fanti, & à tanti bastarebbono le vetouaglie per vno anno. Ma nota che se vi entrassero mesi, & giorni ti bisognarebbe multiplicare per giorni, per essere il piu picciolo numero.



LIBRO SECONDO,
DE NVMERI ROTTI.



VNERI rotti sono queglii che dimostrano le parti de numeri intieri, come $\frac{1}{2}$ vno mezo significa, & $\frac{1}{3}$ vno terzo: cosi di tutte queste altri figure de numeri che seguono $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{8}$, & si scriuono con due numeri l'vno sopra l'altro, cosi il soprano numeratore è chiamato, & quello d'abbasso denominatore, per che dà il nome à le parti: come vedi qua sotto,

$\frac{3}{8}$ numeratore.

8 denominatore.

Questo rotto ti insegna, che facendo d'vno intiero parti 8, ne

8, ne deui pigliare 3, & quando tutti due i numeri farano vguai come questi $\frac{4}{3}$, sempre significano vno intiero: se il numeratore fara maggiore come questo $\frac{5}{3}$ alhora denota 1, intiero & $\frac{2}{3}$.

Del variare de rotti.

Se de 4 intieri ne voi far settime: multiplica 4 via 7, fa 28, & farano $\frac{28}{7}$. Se de le $\frac{12}{7}$ ne vorrai far intieti, cioc 4, parti 28, per 7, ne riefse 4 intieri. Se de $\frac{4}{3}$ ne voi far festi, fa cosi: multiplica 2 fia 6, fa 12, li quali parti per 3, ne riefse $\frac{4}{3}$ & questi tanta parte del integro rapresentano quanta $\frac{4}{3}$.

Nota che tutti i rotti de quali i numeratori, & denominatori hauerano la istessa proporzione farano fra loro vguai, come $\frac{1}{2} - \frac{2}{4} - \frac{3}{6}$ che tanto vale l'vno come l'altro per che la medema proporzione che ha 2 à 6, ha ancora 3 à 9.

Del ridurre in breuita i rotti.

Bisogna prima considerate se tali numeri rotti sono partibili, in terzi, ò quarti, ò quinti, ò festi, & qual si voglia altra proporzione: come $\frac{9}{12}$: per che alhora se partirai ambidue i numeri, cioe il numeratore 9, & il denominatore 12, per terzi, facilmente ti riefse l'intento tuo, come $\frac{3}{4}$ partito il 9, per 3, ne riefse 3, che faia similmente numeratore, & 12 partiti per 3, ne riefse 4, denominatore che vengono ha essere $\frac{3}{4}$ che tanto valeno quanto $\frac{9}{12}$. Quando à caso i rotti non fossero partibili come questo che seguita $\frac{14}{24}$: alhora parti il maggior numero, cioe 432 per il minore che è 324 & hauerai di quoziente 108, col quale di nuouo parti 324, & ti riefse 3, di quoziente. Similmente parti 432, per il medemo 108, & hauerai di quoziente 4, cosi li due quozienti 3, & 4, che valeno $\frac{3}{4}$ ti dimostrano in breuita il valore di $\frac{14}{24}$. Ma perche à le fiate vi sono de numeri rotti, de quali è difficile cosa trouare il suo partitore, ò sia parte aliquota: pero per maggiore intelligenza, ti do ancora vn' altro ezempio, come se hauerai da ridurre in breuita quanto piu si puo $\frac{80}{23}$ fa cosi: parti similmente 80, che è il numero maggiore, per 23, ti auanza 24: per il che di nuouo bisogna che tu parta 28, per 24, & ti soprauanza 4, ancora vn'altra
fiata

fiata parti 24, per 4, & per che alhora niente ti auanza, dirai che 4 che è stato l'ultimo partitore, è la vera parte aliquota, ò vero partitore d'ambidue i numeri 80, & 28. Hora partendo il 28, per questo partitore 4, ne riefce 7, di quoziente. Et similmente partendo 80, per l'isteflo 4, hauera di quoziente 20, li quali vniti infieme fano $\frac{14}{4}$ che tanto valeno quanto $\frac{14}{4}$.

Vi è poi vn' altra sorte de numeri rotti molto facile da abreuare. Come in efempio $\frac{100}{100}$ per che tu non hai fatica, fi non di schizzare i due 00, d'ambidue i numeri così $\frac{1}{1}$ & ti resta $\frac{1}{1}$, che tanto valeno. Il simile potrai fare di questo $\frac{400}{100}$ schizando vno 0, per ogni numero, ti auanza $\frac{4}{1}$ che tanto valeno quanto $\frac{4}{1}$.

Del sommare de rotti.

Se i denominatori farano d'vno isteflo valore come questi $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, alhora somma solo i numeratori, & nota quello numero difopra così.

$$\begin{array}{r} 1\ 2 \\ \frac{5}{8} \quad \frac{7}{8} \text{ che sono } \frac{12}{8} \end{array}$$

Effendo diuerfi i denominatori, come $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{4}$, moltiplica i denominatori fra loro, poi di nuouo i denominatori con gli numeratori vno per vno, dopo somma i numeri che riefcono da le moltiplicazioni. Come nel sudetto efempio di $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{4}$: moltiplica 3, fia 4, fa 12, il quale nota sotto, di nuouo dirai 3, fia 5 fa 15, li quali nota sopra il 5, dopo replica 2 fia 4, fa 8, il quale nota sopra il 2, poi somma 8, & 15, fa 23: pero dirai che $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{4}$ sommati infieme, valeno $\frac{23}{12}$ come vedi qui à canto,

$$\begin{array}{r} 2\ 3 \\ 8 \quad 1\ 5 \\ \frac{2}{3} \quad \frac{5}{4} \\ 1\ 2 \end{array}$$

Come fi somma tre numeri rotti.

Se tre farano i rotti, somma prima due al modo hora detto: poi di nuouo somma questo col terzo. Come se voi radunare

nare $\frac{1}{7}$, $\frac{2}{7}$ & $\frac{3}{7}$, raduna i due primi come di sopra, & sono $\frac{3}{7}$ lequali sommarai con li $\frac{4}{7}$ così dicendo 5, fia 12, fa 60, il quale sarà denominatore: dopo dirai 4, fia 12, fa 48, & 5, fia 23, fa 115: radunati insieme poi 115, & 48, fano 163, liquali noterai con li 60 così $\frac{163}{60}$ che valeno 2, intieri, & $\frac{43}{60}$, come vedi qua sotto.

$$\begin{array}{r}
 23 \\
 815 \\
 \hline
 25 \\
 34 \\
 \hline
 12
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 163 \\
 11548 \\
 \hline
 234 \\
 125 \\
 \hline
 60
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 163 \\
 \hline
 60
 \end{array}$$

Del sommare intieri, con rotti.

Multiplica l'intiero per il denominatore rotto, poi à la somma agiongicui il numeratore. Come se voi sommare 12, intieri con $\frac{2}{3}$: multiplica 3, fia 12, fa 36, à liquali agiongicui il numeratore cioè 2, ti riefse $\frac{38}{3}$ somma del tutto.

Del sommare intieri e rotti, con intieri e rotti.

Se bene hauerai intesi i capi passati, penso che in questo non hauerai molta fatica. Per sommare adunque intieri e rotti, per intieri e rotti: somma prima i due intieri insieme, dopo i due rotti fra loro al modo sudetto. Come in esempio se voi sommare 12, $\frac{1}{4}$, con 6, $\frac{3}{4}$: somma 12, con 6, fa 18: dopo dirai 3, fia 4, fa 12, che sarà il denominatore de i rotti: di nuouo dirai 1, fia 4, fa 4, & 1, fia 3, fa 3, liquali nota di sopra, & sommati tutti due insieme, ti dano $\frac{7}{4}$ come vedi qua.

$$\begin{array}{r}
 12 \frac{1}{4} \quad 6 \frac{3}{4} \\
 \hline
 18 \frac{7}{4}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 7 \\
 34 \\
 \hline
 12
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 12 \\
 \hline
 12
 \end{array}$$

che sono 18 $\frac{7}{4}$

DEL SOTRARE DE ROTTI.

Se i denominatori saranno vguali di valore, come questi $\frac{1}{7}$, $\frac{2}{7}$: sottraendo l'vno numeratore da l'altro, ti resta fatto il conto. Come dal sudetto esempio sottraendo 2, da 5, auanzano 3, liquali notati per numeratore ti dano poi $\frac{3}{7}$. Ma quando i numeratori & denominatori saranno diuerfi, allora

d multipl

moltiplica il denominatore del vno per il numeratore del altro, & ambidue i denominatori fra loro: sottraendo dopo da le due prime moltiplicazioni, il minor numero dal maggiore: ti riefse l'intento. Come in efempio fe voi sottrare $\frac{1}{4}$ da $\frac{1}{2}$: moltiplica 3, fia 3, fa 9, il quale nota sopra: poi replica 2, fia 4, fa 8, il quale notarai fimilmente sopra il 2. Dopo sottrac 8, da 9, ti auanza 1, il quale notarai sopra tutti: moltiplica poi 3, fia 4, fa 12, & questo fara il denominatore, come vedi qua à canto.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 8 \quad 9 \\ \frac{1}{4} \quad \frac{1}{2} \quad \text{che sono di resta} \quad \frac{1}{12} \\ 12 \end{array}$$

Del sottrare rotti da intieri.

Con facilità sottrarai i rotti da intieri, se prima d'uno intiero ne farai tante parti, quante fara il valore del denominatore. Dopo sottraendo il numeratore dal denominatore de i numeri rotti, & il restante notarai per numeratore. Come se voi sottrare $\frac{4}{7}$ da 3, intieri, farai $\frac{2}{7}$ d'vno intiero, & da esse sottrarai le $\frac{4}{7}$: così ti auanzano 2, intieri, & $\frac{1}{7}$ come vedi in figura.

$$\frac{4}{7} \text{ da } 3 \quad \frac{2}{7} \quad 7 \quad 2 \quad \frac{1}{7}$$

Del sottrare intieri è rotti, da intieri.

Sottrato che hauera i intieri da intieri, de vno de i restanti ne farai fimilmente tante parti, quante fara il valore del denominatore: dopo sottrarai il rotto da rotto. Come se voi sottrare 6, $\frac{1}{4}$, da 8, intieri: sottrac prima 6, da 8, auanza 2, & di 1, di questi 2, ne farai $\frac{1}{4}$. da liquali sottraendo $\frac{1}{4}$ auanza 1, intiero, & $\frac{1}{4}$ come vedi qua.

$$6 \quad \frac{1}{4} \text{ da } 8 \quad 4 \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} \quad \& 1.$$

DEL MVLTIPLICARE DE ROTTI.

Non è di minor vtilità la moltiplicazione ne i rotti, che sia ne i numeri intieri: pero non fara fuori di proposto, farni vn breue discorso. Questa fara adunque vna generale regola, che

la , che ogni numero rotto , che ti farà propoſto à moltiplicare con altro rotto , ſempre moltiplicarai i numeratori fra loro , & ti rieſſerà il numeratore che cerchi. Di nuouo moltiplicarai i denominatori fra loro , & hauerai il denominatore , il quale notarai ſotto , ſignata prima la linea di meggio. Come in eſempio tu hai da moltiplicare rotto , per rotto , cioè $\frac{2}{7}$ per $\frac{1}{3}$: moltiplica adunque 2 , ſia 4 , ſa 8 , che farà numeratore. dopo moltiplica 3 , ſia 5 , ſa 15 , il quale per denominatore ſotto ſcriuerai , come vedi qua.

$$\frac{2}{7} \text{ per } \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$$

Del moltiplicare de intieri, per rotti.

Se intieri per rotti hauerai da moltiplicare : prima moltiplica gli intieri, per il denominatore de rotti, coſi farano tutti rotti , ſe à quella moltiplicazione ſotto ſcriuerai il denominatore de rotti. dopo moltiplica l'vno per l'altro , al modo hora detto. Come in eſempio ſe voi moltiplicare 4 , intieri per $\frac{1}{7}$: prima moltiplica 4 , ſia 7 , ſa 28 , al quale ſotto ſcriuerai il 7 , coſi $\frac{28}{7}$: dopo moltiplica queſti due numeri rotti fra loro , dicendo 3 , ſia 28 , ſa 84 , che farà numeratore : Et ſimilmente dirai 7 , ſia 7 , ſa 49 , denominatore , il quale noterai coſi, $\frac{84}{49}$.

Del moltiplicare intieri e rotti, per rotti.

Ma ſe intieri e rotti, per rotti ti accaderà moltiplicare, prima moltiplica gl' intieri , per il denominatore de i ſuoi rotti , aggiogendoui dopo il rotto à la ſomma. Il che fatto moltiplica l'vno numero per l'altro , al modo ſudetto. Come in eſempio ſe voi moltiplicare 4 , $\frac{1}{3}$ per $\frac{1}{7}$: prima farai de li 4 , intieri terzi , dicendo 3 , ſia 4 , ſa 12 , al quale aggiogicui il terzo, farano poi 13 , cioè $\frac{13}{3}$ li quali moltiplicati con $\frac{1}{7}$ al modo ſudetto ti dano $\frac{13}{21}$ come vedi qua.

$$4 \frac{1}{3} \text{ per } \frac{1}{7} = \frac{4 \frac{1}{3}}{\frac{1}{7}} = \frac{29}{21}$$

Del moltiplicare intieri, per intieri e rotti.

Se intieri , per intieri e rotti s'hauerano da moltiplicare,

d 2 farai

farai de gli intieri rotti, de la medema denominazione che farano i rotti, & quelli aggiongierai ancora à la somma. dopo multiplica l'vno per l'altro. Come se voi multiplicare 5, intieri per 4, $\frac{1}{4}$: multiplica prima 5, sia 5, fa 15, & farano $\frac{15}{4}$. dopo multiplica 3, sia 4, fa 12, à liquali aggiongicui li $\frac{1}{4}$ & farano $\frac{13}{4}$: multiplicando dopo $\frac{13}{4}$ per $\frac{4}{1}$, ti riefse $\frac{13}{1}$ come vedi qua.

$$\begin{array}{rccccccc} 5 & \text{per} & 4 & \frac{1}{4} & & & & \\ & & & & 5 & 4 & & 210 \\ & & & & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \text{per} & \frac{4}{1} \\ & & & & & \frac{1}{4} & & & 9 \end{array}$$

Del multiplicare intieri e rotti, per intieri e rotti.

Questa non fara molto dissimile à la antedetta, per che ti bisogna similmente de gl' intieri farni rotti, del istessa denominazione del suo rotto vno per vno. dopo agiontoui i rotti, multiplicarai l'vno per l'altro. Come se voi multiplicare 3, intieri & $\frac{1}{4}$, per 4, intieri & $\frac{1}{7}$: prima farai de gli 3, intieri quarti, poi vi aggiongierai li $\frac{1}{4}$ & farano $\frac{13}{4}$: similmente de gli 4, intieri ne farai settime, & aggiongiendoui $\frac{1}{7}$, farano poi $\frac{29}{7}$: lequali moltiplicate con li $\frac{13}{4}$, ti riefse in somma $\frac{337}{28}$. Et tanto ne viene de la multiplicazione di 3, $\frac{1}{4}$, per 4, $\frac{1}{7}$.

DEL PARTIRE DE ROTTI.

Per la scambieuole diuisione de rotti, cioe del maggiore per il minore, & per contrario del minore per il maggiore, nota questa generale regola. Ne i rotti che ti accadera partire, multiplica il numeratore del numero che si ha da partire, per il denominatore del numero che parte: & hauerai il numeratore. Dopo multiplica il denominatore del numero che haurai da partire, per il numeratore del numero che parte: & ne riefcera il denominatore che ricerchi. Come se voi partire il maggiore, per il minore, cio è $\frac{4}{7}$ per $\frac{1}{10}$: prima multiplica 2, sia 5, fa 10, che fara denominatore: poi multiplica 3, sia 4, fa 12, che fara tuo numeratore: cosi partiti $\frac{4}{7}$ per $\frac{1}{10}$ hauerai di quoziente $\frac{12}{5}$, come vedi qua sotto.

$$\begin{array}{r} 12 \\ \frac{4}{7} \times \frac{1}{10} \\ 10 \end{array}$$

Se per

Se per contrario, vorrai partire il minore rotto, per il maggiore: fa la multiplicazione de numeratori, & denominatori al modo che nel primo capo ti ho detto, & hauerai l'intento tuo. Come se $\frac{1}{4}$ ti accade partire per $\frac{1}{2}$ hauerai di quoziente $\frac{2}{4}$.

Se vguali farano i denominatori, parte l'vno de numeratori per l'altro. Come se vorrai partire $\frac{1}{4}$ per $\frac{1}{4}$, ti bisogna partire 4, per 2, & il quoziente fara 2, li quali noterai sopra cosi $\frac{1}{2}$.

Del partire intieri, per rotti.

Quando adunque ti accadera partire intieri, per rotti: multiplica il denominatore del rotto per se stesso: & di nuouo multiplica quella somma per gl'intieri. Ma piu facilnente si fara, se prima tu multiplicarai gl'intieri per il denominatore de rotti: dopo multiplicando il denominatore de rotti, con il numeratore de l'altro, il quale fara numeratore. Di nuouo bisogna multiplicare i rotti fra loro, al modo dato nel primo capo del partire.

Come in esempio se voi partire 5, intieri per $\frac{1}{4}$: multiplica 4, fia 5, fa 20, cosi il primo rotto fara $\frac{20}{4}$, & il partitore $\frac{1}{4}$: per il che multiplica 4, fia 20, fa 80, che fara numeratore, & 3, fia 4, fa 12, che fara denominatore, come vedi in figura.

$$\begin{array}{r} 80 \\ 5, \text{ per } \frac{1}{4} \quad 5 \quad \frac{20}{4} \text{ per } \frac{1}{4} \\ \frac{4}{12} \quad \quad 12 \end{array}$$

Del partire rotti, per intieri.

Per contrario se rotti, per intieri hauerai de partire: multiplica gli intieri, per il denominatore de rotti, & fara denominatore, al quale sopra scriuerai il numeratore gia dato. Come se $\frac{1}{4}$ per 5, intieri ti accadera partire: multiplica 4, fia 5, fa 20, al quale notando sopra il 3, hauerai di quoziente $\frac{1}{3}$.

Del partire intieri, per intieri e rotti.

Ancora che varij esempi io ti duoni, per miglior tua intelligenza, nondimeno se bene vi consideri, vi è poca differenza. Et che sia il vero, se intieri, per intieri e rotti ti biso-

d 3 gnara

gnara partire, multiplica gli intieri per il denominatore de rotti. Et hauerai due numeri rotti, li quali partirai dopo l'vno per l'altro. Come in esempio se 8, intieri, vorrai partire per $5 \frac{1}{4}$: multiplica prima 4, fia 8, fa 32, & farano $\frac{32}{5}$: di nuouo dirai 4, fia 5, fa 20, à liquali aggiongicui li $\frac{1}{4}$, & farano $\frac{21}{4}$. Dopo se partirai $\frac{32}{5}$ per $\frac{21}{4}$ al modo gia piu fiate detto, hauerai di quozziente $\frac{11}{9}$ come vedi qua.

$$8, \text{ per } 5, \frac{1}{4} \quad \begin{array}{r} 8 \quad 5 \\ \frac{4}{11} \quad \frac{4}{20} \\ \frac{1}{11} \quad \frac{1}{11} \end{array} \quad \begin{array}{r} 128 \\ \frac{11}{9} \text{ per } \frac{11}{9} \\ 92 \end{array}$$

Del partire intieri e rotti, per intieri.

Per esser questo partimento quasi medemo con l'antidetto, la sua pratica fara quella istessa. Come in esempio, se ti accadera partire 5 intieri & $\frac{3}{4}$ per 8, intieri: multiplica similmente 4, fia 5, fa 20, à liquali aggiongicui li $\frac{3}{4}$, farano $\frac{23}{4}$, multiplica poi 4, fia 8, fa 32, & farano $\frac{11}{4}$: liquali partendo li $\frac{23}{4}$, ti dano di quozziente $\frac{11}{4}$. Così vedi che il denominatore del sudetto esempio, qua è douentato numeratore, ne vi è stata altra differenza ne le multiplicazioni.

Del partire intieri e rotti, per rotti.

Se intieri e rotti, per rotti bisogna partire: multiplica l'intiero per il denominatore del suo rotto, à laqual somma gli aggiongierai l'istesso rotto, poi parti l'vno rotto, per l'altro secondo la data regola. Come se fossero da partire $6 \frac{1}{4}$ per $\frac{1}{4}$: multiplica 3, via 6, fa 18, à quali aggiongendoui li $\frac{1}{4}$ farano $\frac{73}{4}$, partendoli poi per $\frac{1}{4}$ ti riefce $\frac{73}{1}$.

Del partire intieri e rotti, per intieri e rotti.

Quando che intieri e rotti, per intieri e rotti ti bisogna partire: multiplica similmente gli intieri, per i denominatori de suoi rotti, & à la somma aggiongicui i rotti: dopo parte l'vno rotto per l'altro secondo la regola piu fiate detta. Come in esempio se 4, intieri & $\frac{1}{4}$, per 2, intieri & $\frac{1}{4}$ vorrai partire: multiplica prima 3, fia 4, fa 12, à liquali aggiongendoui li $\frac{1}{4}$ hauerai $\frac{49}{4}$ per il primo rotto. Dopo multiplica 2, fia 4, fa 8, al quale aggiongicui li $\frac{1}{4}$ & farano $\frac{33}{4}$, li quali
part

partendo $\frac{14}{4}$ ti dano di quozziente $\frac{11}{4}$, come vedi qua sotto signato in figura.

$$\begin{array}{r}
 4, \frac{5}{4} \text{ per } 2 \frac{1}{4} \\
 \hline
 \begin{array}{cc}
 5 & 6 \\
 \frac{14}{4} & \frac{11}{4} \\
 4 & 4
 \end{array}
 \end{array}
 \text{ che sono } \frac{11}{4}$$

LA REGOLA DEL TRE NE I ROTTI.

Descritti che hauerai i tre numeri conosciuti, per trouare il quarto non conosciuto: Multiplica il terzo numero rotto, per il secondo: poi parti la somma per il primo, & il quoziente ti dimostrara il quarto numero non conosciuto che ricerchi. Come in esempio $\frac{1}{4}$ di braccio si vendono $\frac{1}{4}$ di scutto, quanto costarano $\frac{1}{4}$: multiplica li $\frac{1}{4}$ per $\frac{1}{4}$ ne riefse $\frac{1}{16}$, le quali partite per $\frac{1}{4}$ il quozziente fara $\frac{11}{16}$. Et tanto dico che costarano li $\frac{11}{16}$ di braccio.

Ma se piu cose vi entraranno insieme. Come se in vno anno, tre mesi, & tre settimane spendo scutti 200, quãto spendero per 7, mesi. Alhora ridurrai ogni cosa al minor numero, come in questo luogo à settimane, facendo l'anno di 52, settimane, & li 3, mesi di 12, à lequali aggiongine 3, saranno 67. Con la simile ragione fa de li 7, mesi 28, settimane, poi finisce il resto secondo la regola.

✱

LIBRO TERZO, DE COMPAGNIE.



QUESTA regola è poco differente, da la regola del tre gia detta. Et l'esempio suo sarà questo. Tre mercanti fanno compagnia, il primo sborsa scutti 120. Et è stato in compagnia mesi 6. Il secondo ha posto scutti 320, & è stato in compagnia mesi 4. Il terzo ha posto scutti 200, & è stato mesi 3, in compagnia. Et hano guadagnato scutti 1000: hora volendo saper quanto tocca di guadagno per vno de li scutti 1000: multiplica i scutti per i mesi, & nota ogniuno à parte, dopo somma li tre numeri che sono usciti insieme. Di nuouo multiplica il guadagno, per ogniuno de i tre numeri che sono usciti da le multiplicazioni: & quelle parti per la somma de li tre numeri de le multiplicazioni. Come in esempio, multiplica i primi scutti 120, per 6, mesi, ne riesce 720: multiplica poi i scutti 320, per 4, mesi, ne riesce 1280. Multiplica similmente li scutti 200, per 3, mesi, ne riesce 600, li quali sommati tutti tre insieme fanno 2600.

Di nuouo multiplica il guadagno, cio è li scutti 1000, per il primo numero de 720, & ne riesce 720000: il quale partirai per la somma sudetta, cio è 2600, & il quoziente primo sarà de scutti $276 \frac{4}{11}$, & questa sarà la parte del guadagno del primo mercante.

Di nuouo multiplica li scutti 1000, per il secondo numero, cio è 1280, ne riesce 1280000, li quali parte per 2600, ne riesce $492 \frac{8}{11}$ che sarà il guadagno del secondo mercante.

Finalmente multiplica li scutti 1000, per il terzo numero, cio è 600, ne riesce 600000, li quali parti similmente per 2600, ne riesce scutti $230 \frac{1}{13}$. Et tanti scutti dico che toccherà

cara di guadagno al terzo mercante de li scutti 1000. Quando non vi entrassero mesi, facilmente scioglieresti questi dubbij con la regola del tre.

Altro esempio variato.

Tre mercanti fano compagnia, il primo ha posto scutti 20. Il secondo scutti 23. Il terzo scutti 29, con questa condizione che il guadagno si debba partire vguualmente in termine di 5 anni. Auient che per certi occorrenti, la compagnia non ha durato che anni 3, & hano guadagnato scutti 216, se voi saper quanto tocca per vno del guadagno, dirai se non vi fossi il patto, al primo toccarebbono scutti 60, al secôdo 69, al terzo 87, adunque se il patto si fossi adempiuto ad ogniuno toccauano scutti 72: dirai adunque se 12, che è la differenza da 60, al 72, si fa di 5, anni, quanto da 3 anni: multiplica 3, in 12, fa 36, parti per 5, ne rieße $7\frac{1}{5}$, li quali congiongì con li 60, fa $67\frac{1}{5}$ per il primo.

Similmente la differenza del secôdo è 3: dirai adunque se 3, si fa de 5, quanto 3: multiplica 3, in 3, fa 9: parti per 5, fa $1\frac{4}{5}$: li quali congiongì con li 69, fa $70\frac{4}{5}$, per il secôdo.

Ancora per il terzo dirai se 15, si fa da 5, quanto da 3, multiplica 3, fa 15, fa 45: parti per 5, ne rieße 9, li quali sottrai da 87, & auanza 78 che fara la parte del terzo.

Altro esempio.

Tre gentilhuomini fano fabricare vna casa, del valore de scutti 2520. Et il primo ne vole $\frac{1}{3}$. Il secondo $\frac{1}{4}$. Il terzo $\frac{1}{6}$ de la casa. Volendo saper quanto deue sborsare ogniuno per sua parte. Somma le parti, cioè $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ ne rieße $\frac{11}{12}$, che fano vno intiero: poi parti li scutti 2520, per $\frac{11}{12}$, cioè per 3, ne rieße scutti 840, & tanti scutti tocca à pagare al primo gentilhuomo, il quale vole il terzo de la casa. Dopo parti li scutti 2520, per $\frac{1}{3}$, cio è 4, ne rieße scutti 630. Et tanto deue pagare il secôdo, che vole $\frac{1}{4}$ de la casa. Di nuouo parti li scutti 2520, per $\frac{1}{4}$, ne rieße scutti 1050. Et tanto deue pagare il terzo gentilhuomo, che vole $\frac{1}{6}$ de la casa.

*Esempio terzo di compagnie di bestiami
in varij tempi.*

Quando hauesti dato diuersi numeri di bestiami in diuersi tempi al tuo massaro à partimento, come si suol dire. Come per esemplo gl' hauesti dato 100, vache à la mita in termine de cinque anni: & passati gli due primi anni glie ne desti 300, altre: Dopo passato vno anno è meglio, glie ne desti altre 150, tutte sotto la medema condizzone de le prime cento. Se vorrai saper infra quanti anni si debbe fare il partimento: prima fa conto de tutti gl' anni che mancavano à compire i termini, & con quegli multiplica il numero de le vache di quel termine apartatamente: poi somma tutte quelle multiplicazzioni, & parte per la somma intiera di tutte le vache: come in esemplo à le prime cento mancavano anni $1 \frac{1}{5}$: à le 300 vache mancava di termine anni $3 \frac{1}{5}$: à l'vltime mancavano anni 5, con questo $1 \frac{1}{5}$ multiplica le 100, ne riesce 150, con gli $3 \frac{1}{5}$ multiplica le 300, ne riesce 1050, & con gli 5, multiplica le 150, ne riesce 750, liquali numeri radunati insiema, fano 1950: questo parti per il numero de le vache, che sono 550, ne riesce di quozziante 3, & $\frac{6}{11}$ & tanto tempo dico che deue tenir il tuo massaro tutte le vache, dopo l'vltime 150, che gli desti, come vedi qua in figura.

Vache	100	300	150
Anni	$1 \frac{1}{5}$	$3 \frac{1}{5}$	5
Multiplicazione	150	1050	750

$$\begin{array}{r}
 3 \\
 100 \\
 1050 \\
 750 \\
 \hline
 \text{Somma} \quad 3 \quad \frac{6}{11} \\
 550
 \end{array}$$

De barati.

Accade il piu de le volte, che i mercanti fra loro fano debarati, pero s'alcuno ti volesse dare del panno in barato, che valesse di giusto presso 10, & ne domandasse 12, & tu ne hauesti che valesse à giusto presso 7, volendo poi saper quanto ti bisogna crescere il tuo, accio non perdi: opera per

per la regola del tre così. Se 10, mi da 12, quanto 7, & ti riesse 8, $\frac{7}{8}$ così saprai il guadagno.

Secondo esempio.

Vno ha dato quello che valeua 5, per 6, & ha preso quello che valeua 14, per 17. Se voi saper quanto ha perso, opera similmente per la regola del tre così. Se 5, me da 6, quanto 14, & ne riesse 16, & $\frac{4}{16}$, & da questo conosci che ha perso $\frac{4}{16}$ per ogni $\frac{1}{16}$.

De guadagni & perdite.

Quando tu voi comprare le mercanzie à vno guadagno sicuro fa così. Dirai quanto compraro la lana, accio che venduta 6, per 100, possi guadagnare 20, per 100, opera per la regola del tre così, Se 120, si fa di 100, quanto 6, & ne riesse 5, & tanto si puo comprare la lana per 100.

Altro esempio.

Io ho comprato il peppe à scutti 24, per 100, quanto vendaro l'onzia accio guadagni 30, per 100, tu sai che se debbo guadagnare 30, per 100, che bisogna che 100, douenti 130. Dirai adunque se 100, si fa 130, quanto si fara 24, & ti riesse per la regola del tre 31 $\frac{4}{10}$: pero bisogna che scutti 24, di peppe si vendano scutti 31 $\frac{4}{10}$.

Altro esempio.

Comprando 3, scutti il cendale, & vendendo 2, la differenza sarà 1, dirai adunque se 3, perde 1, quanti 100, & ne riesse 33 $\frac{1}{3}$ & tanto perdi per 100.

*Il modo di conoscere le differenze de pesi
da luogo à luogo.*

Esempio se voi saper quante onzie di Milano, sia la liura di Genoua, sapendo che la liura di Milano è 13, onzie in Venezia: & la Venetsiana è onzie 9 in Mompelcier, & la liura di Mompelcier è onzia 15, $\frac{1}{5}$ in Genoua: fa così Ordina prima i numeri in tal modo,

12
 Milano, Venezia $\frac{1}{13}$, Mompelcier $\frac{9}{15}$, Genoua 15 $\frac{1}{5}$
 c 2 Dopo

Dopo multiplica i numeri inferiori fra loro, cioè 12, fia 12, fa 144, di nuouo multiplica 144, fia 144, fa 20736, il qual parti prima per 13, il quoziente fara 1595, $\frac{5}{11}$: il qual partito poi per 9, il suo quoziente fara 177, $\frac{5}{11}$. partendo ancor questo per 15, $\frac{5}{11}$, ne rieße onzie 11 $\frac{5}{17,4}$. Et tante onzie di Millano, fara la liura di Genoua. Se voleſti ſaper il contrario, quante onzie di Genoua, ſia la liura di Millano: alhora dirai ſe 11, $\frac{5}{17,4}$ mi da 12, quanti mi dara 12: per la regola del tre hauerai 12, $\frac{11}{17,4}$. Et tante onzie di Genoua, fara la liura di Millano.

Per ſaper l'anno del biſeſto.

Se voi ſaper il biſeſto, il quale ſerue à molte coſe, fa coſi: Parti gl' anni di Chriſto per 4, facilmente il trouarai, per che ogni quatro anni corre vno giorno.

Del aureo numero.

Gli è ancor vtiliſſimo ſaper l'aureo numero, per ſaper poi le congionzioni de la Luna, & Sole. Pero fa coſi, agiongi 1, al numero de gl' anni di Chriſto, poi parti la ſomma per 19, Et il numero che ti ſoprauanza dal partimento, quello fara l'aureo numero. Ma auertifiſi, che ſempre l'anno de gli aſtologi comincia al principio di Ariete, il quale è à li 10, di Marzo, nel quale il ſole comincia à intrare nel ſegno d'Ariete. Et accio meglio mi intendi, ti do l'eſempio del anno 1555, al quale agiongi 1, fa 1556, & queſto parti per 19, come vedi qua ſotto ti auanza 17, che fara l'aureo numero del anno 1555.

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 2 \\
 737 \\
 2882 \\
 \hline
 81 \\
 \hline
 199
 \end{array}$$

La cognizione de la patta.

Conoſciuto l'aureo numero, multiplicalo per 11, & parti la ſomma per 30, il reſtante fara la patta. Come in eſempio,
Sia il

Sia il detto aureo numero 17, il quale multiplicato per 11, fa 187, partito poi 187, per 30, ne riesse 6, di quoziente, & auanza 7, che sarà il numero de la patta, del anno 1555.

De la congiunzione del Sole, & Luna.

Ritrouato il numero de la patta gia detto, aggiongeu il numero de mesi, che sono passati dal primo di Marzo. Et il numero de giorni del mese che corre. dopo parti la somma per 30, il restante ti dimostrara la congiunzione. Come del 1555, il numero de la patta è 7, presupposto che si facesse il quesito del mese di Nouembre, à di 14, aggiungi al 7, 9. Et 14, fa 30, liquali parti per 30, niente vi auanza, pero dirai che del 1555, à li 14, di Nouembre, si fa la congiunzione del Sole, & Luna.

Di alcune proprietà de numeri.

Alcuni sono numeri imperfetti, & alcuni perfetti li quali sono commodissimi in tutte le operazioni, & questi si formano da la somma de le sue parti aliquote, come fra diece vi è 6, il quale si forma da 1, 2, 3, parti aliquote di 6. Tra le decene vi è 28, che si forma da 1, 2, 4, 7, 14. Ne le centinaia non vi è similmente altro numero perfetto che 496. Ne le migliaia 8128.

Et quegli sono numeri imperfetti, liquali dal radunamento de tutte le sue parti aliquote fano la somma ò maggiore, ò vero minore, come 220, fa 284, & scambievolmente 284, fa 220. Et per questo sono detti numeri amatorij, vi sono poi infinite altre proprietà de numeri, le quali per esser breue tralascio per hora. Come si cauino poi tutte le parti aliquote de numeri, tè lo dimostraro piu adietro.

De meriti & compensazioni.

Merito è vno augmento del debito al creditore, come tu possiedi scutti 100, miei, & sei tenuto darmi ogni anno oltre li scutti 100, come sarebbe scutti 10. Et sono di due sorte de meriti, l'vno sempio, l'altro composto, ò vero al fine del anno. Gli è sempio, quando il merito non si vnisse al principale, & che di ambidue il creditore ne pigli redito. Come io ti ho prestato scutti 100, accioche paggi di sim-

plice merito scutti 10, ogni anno, così in tre anni mi deui per li scutti 100, prestati, solo scutti 130, contato principale & merito.

Si dice merito composto, ò vero al fine del anno, quando del principale, & merito, d'ambidue ne pigli redito, & guadagno. Come ti ho imprestato scutti 100, à 10, per 100, al fine del anno, per anni 3. Et il primo anno mi cresci $\frac{1}{10}$ al principale, & sono 110, scutti. Et per il secondo anno scutti 11, & sono 121, scutti: finalmente per il terzo anno mi cresci scutti 12, $\frac{1}{10}$, & sono in somma scutti 133, $\frac{1}{10}$ contato il tutto.

Se à caso questo merito composto, non caminasse saluo che anni 2, & mesi 6, farai così come ti ho detto, per i due, primi anni & saranno scutti 121: poi per li 6, mesi, somma scutti 100, col merito di vno anno, che è 10, & il merito di 6 mesi fa 115 $\frac{1}{10}$: dopo moltiplica il principale, & merito di vno anno, cioè 110, per se stesso, fa 12100: liquali parti per 115 & $\frac{1}{10}$: ne ricsse scutti 104, $\frac{1}{10}$: che è il principale & merito di 6, mesi, aggiungiendoui poi il merito di due anni, cioè scutti 21, sono in somma scutti 125, $\frac{1}{10}$, per anni 2, & mesi 6.

La compensazione si fa, quando quello che sborfa i danari, golde alcuna cosa del debitore, come casa, ò altro. Similmente come quando il creditore scode i danari innanzi tempo.

Et questa compensazione è similmente di due sorte, l'una semplice, l'altra composta, ò al fine del anno. Gli è semplice, quando il principale si scema al contrario del semplice aumento, per termini di proporzione. Come in esempio il semplice aumento à 10, per 100, fa 110, al primo anno: pero in questa semplice compensazione se voi saper in 3, anni, di quanto si compensariano scutti 100, à 10, per 100: moltiplica 100, per 100, fa 10000, liquali parti per 110, ne ricsse 90, $\frac{1}{10}$. Nel secondo anno, il semplice merito fa scutti 120, pero moltiplica ancora 100, per 100, fa 10000, liquali parti per 120, ne ricsse 83, $\frac{1}{10}$. Nel terzo anno scutti 100, di semplice merito, fariano scutti 130: pero moltiplica 100, per 100, fa 10000, & questi parti per 130, ne ricsse

rieffe 76, scutti & $\frac{1}{11}$: che è la somma che cerchi.

Se ne la compensazione semplice vi entreranno mesi. Come ti do scutti 100, per compensazione semplice à 10, per 100, per anni 2, & mesi 6, & voi saper à quanto riefse la somma: multiplica 100, per 100, fano 10000, liquali parte per 110, ne riefse 90 scutti & $\frac{1}{11}$, come ti ho già detto dinanzi, & per il secondo anno ne riefse scutti 83, $\frac{1}{11}$: hora per il termine de 6 mesi, tu sai che nel semplice merito, il termine di anni 2, & mesi 6, rileua scutti 125: pero multiplica 100, per 100, fa 10000, liquali parti per 125: & hauerai la somma de anni 2, & mesi 6, cioe scutti 80. Ne la compensazione al fine de l'anno, vi è vna scemazzione contraria al augmento del merito composto. Come in esempio, Nel merito composto scutti 100, al primo anno crescono di 10: pero se voi saper ne la compensazione composta di 3, anni, quanto si scemariano scutti 100, à 10, per 100: multiplica 100, per 100, fa 10000, li quali parti per 110, ne riefse scutti 90, $\frac{1}{11}$ per il primo anno. Nel secondo anno il merito composto è de scutti 121, pero multiplica 100, per 100, fa 10000, liquali parti per 121, ne riefse scutti 82, $\frac{1}{11}$. Nel terzo anno il merito composto farebbe di scutti 133, $\frac{1}{11}$: pero multiplica 100, per 100, fa 10000, liquali parti per 133, $\frac{1}{11}$, & hauerai l'integra compensazione di 3, anni, cio è scutti 75, $\frac{1}{11}$.

Sel termine de la compensazione al fine del anno, fossi di anni 2, & mesi 6: compensarai prima i due anni al modo hora detto, poi per i sei mesi, multiplica 100, per 100, fa 10000. Et per che nel merito composto di 2 anni, & 6, mesi, la somma farebbe di scutti 125, $\frac{1}{11}$, pero parti li 10000, per 125, $\frac{1}{11}$, ne riefse l'intento tuo, de la compensazione composta di anni 2, & 6, mesi, cio è scutti 79, $\frac{1}{11}$.

*In quanti anni ogni merito, si fa vguale
al principale.*

Se voi saper à 12, per 100, in quanti anni si fa vguale il merito, parti 72, per 12, ne riefse 6, & in tanti anni si fa vguale. Et nota che questo numero 72, ti serue ad ogni sorte di merito.

De fitti.

De fitti.

I fitti si possono far di varij modi, ma per hora ti do solo questo esempio. Vno gentilhuomo ha affitata vna sua casa ad vno mercante, à scutti 200, l'anno, per anni 5, hora il gentilhuomo vorrebbe tutti i danari al principio del affittamento, il che non fa di patto, nondimeno il mercante si contenta sborsare detta somma, mediante che guadagni scutti 10, per 100. Hora se voi saper quanto deue diffalcare il gentilhuomo de la somma di scutti 1000, che gli deue per il fitto di 5, anni. Dirai se 100, mi da 10, in vno anno, sono 110, così vedi che 10, da 11: multiplica adunque 200, per 10, fa 2000. Et parti per 11, ti riesse 181 $\frac{9}{11}$ per il primo anno. Di nuouo multiplica 181, $\frac{9}{11}$, per 10, fa 1818, $\frac{81}{11}$: liquali parti per 11, ne riesse 165, $\frac{9}{11}$, per il secondo anno. Di nuouo multiplica 165, $\frac{9}{11}$, & parti per 11 la somma, ti riesse 150 $\frac{9}{11}$. Il simile farai del quarto, & quinto anno: poi somma tutti i numeri de li 5, anni insieme, hauerai la somma de scutti 766, $\frac{1773}{11}$ per il fitto di cinque anni. Et tanto dico che toccarebbe al mercante à pagare al principio del fitto.

De giuochi.

Giocando occorreno à le fiata i piu strani casi non mai piu vditì. Come in esempio due giuocano à 10 partite, ò vero 10 giuochi. Et il primo ne ha guadagnate 7, il secondo 9, accade certo inconueniente che non si puote finire. Se voi saper quanto ogniuno douerebbe riceuere del deposito, fa così, Diffalca 7, da 10, auanza 3, similmente diffalca 9, da 10, auanza 1, la progressione di 3, è 6, & quella di 1, è 1: partendo adunque il deposito in 7 parti, 6 toccano al secondo, & 1 parte al primo.

Altro esempio.

Vno dice, Voglio giocare con questo patto, che tu nõ possi vincere, se non guadagni 3, giuochi, & io, vincendone vno, voglio hauer vinto. Et poniam caso che quello che bisogna che guadagni 3 giuochi, metti in giuochò scutti 2, l'altro non è tenuto à mettere scutti 12: questa è la ragione che se
giuoc

giuocassero à 1, giuoco, bastarebbono scutti 2 : & à due giuochi 6, per che vincendo solo 2, giuochi, guadagnarebbe scutti 4 : ma questo sta con pericolo di perdere il secondo, vinto il primo : pero deue guadagnare scutti 6, & à 3 giuochi scutti 12, per che si indopia la difficulta, & pericolo.

Altro esempio.

Due giocando vno à posto 4, contra 5, & il secondo 13, contra 16, volendo saper chi à fatto miglior condizzone, questo si fa per la regola del tre, multiplicando 5, in 13, fa 65, parti 4, ne riesse 16, $\frac{1}{4}$ & tanto doueua porre il secondo, cio è 13, contra 16, $\frac{1}{4}$.

De i giuochi di memoria.

Poniam caso che tu volesti indouinare quanti numeri ha pensato il tuo compagno : fa che lui vi agiongi la mitta del numero pensato : & se vi restara mezo, di che lo faccia intiero : & di nouo agioga la mitta di tutto il numero, & se vi fara mezo, che lo faccia intiero. Dopo che ne caui tutti gli 9, de la somma, & tanti noue quanti lui cauara, tu conta tante fiate 4, & hauerai il numero pensato : & questa è la ragione per che la proporzione di 9, à 4, è composta da 2, sesquialtere.

L'esempio è questo. Poniam caso che il compagno hauesse pensato 7, dicendo che vi agionghi la mitta fara 10, $\frac{1}{2}$ se lo fa intiero, faranno poi 11. Di nouo agiongendoui la mitta di tutto il numero fara 16, $\frac{1}{4}$ facendolo intiero, faranno 17, se ne caua 9, aresta à 8, & tu per il 9, che à cauato ne conti 4, & 1, per il primo numero rotto fa 5, & 2, per il secondo rotto fa 7, che fu il numero pensato.

Secundo esempio.

Sel tuo compagno nascondessi tre cose, come vno anello, & vno guante, & vno pomo, dandoli à tre diuerse persone: fa che tu prima noti bene le tre cose, che lui ha nascoso : dopo fa sedere per ordine quegli tre huomini, ò donne, poi habbi 24, segni de quali 1 ne darai in mano al primo assentato, & 2 al secondo, & 3 al terzo : dopo partiti alquanto discosto, & comanda al compagno che dia de gli 18 segni che sono soprauanzati, altre tanti segni à quello
f che

che sono soprauanzati, altre tanti segni à quello che à l'anello, quanti lui ne ha in mano, & à quello che ha il guante, gliene dia il doppio, & à quello che ha il pomo quattro volta tanti segni come hebbe la prima fiata. A l'hora ritorna à la tauola, & conta quanti segni sono ancora soprauanzati, i quali sempre auanzano ò 1, ò vero 2, ò 3, ò 5, ò vero 6, ò 7, per indouinare hora da questi segni, chi hà i pegni, ti bisogna hauer queste parole in memoria, cio è / *Aue / stella / maris nativ / via / rectis / fide /*. Et poniam caso che fossi auanzato vno sol segno, farai la tua figura sopra la tua parola prima / *Aue* / dirai che A è la prima vocale, così che il primo à chi tu desti vno segno, ha il primo, cio è l'anello, il secondo il guante, il terzo il Pomo: se à caso auanzassero dal partimento due segni, pigliarai la seconda parola che è / *stella* / & dirai, che quello à chi desti tu vno segno, che è primo ha nascoso il guante, & il secondo l'anello, il terzo il pomo. Vi sono poi molti altri giuochi, come quello di Giosapho che si fa alogiando trenta tauole in circolo, mescolando bianche, & negre co' le vocali di questo verso: *Populeam virgam mater regina ferebat*. Dopo cauando tutti gli segni che sotto al 9, capitarano, auanzano poi le tauole tutte di vno colore, & altre escono fuori: & bastauì di questi per hora.

DE LE PARTI ALIQUOTE.

Quando vno numero suputa l'altro, il quale di nuouo ne suputi altri, che siano parti aliquote del numero à te proposto, qual si voglia di questi numeri è la parte aliquota del numero proposto: come in esempio se 3, suputa 9, & 9, 27, farano parti aliquote di 54, cio è la mita, & sesta, & decima ottaua parte aliquota di 54. Ma nota che i numeri pari come 30, 40, hano la sua seconda parte aliquota, magi dispari come 17, 15, non l'hano. Di piu tutti i numeri dispari non hano parti aliquote nominate da numero pare: Come sarebbe seconda, quarta, sesta, & altre. Ma accio che sapi bene suputare tutte le parti aliquote di qual si voglia numero, nota il seguente esempio del numero 462. Parti 462, prima per 2, fa 231, poi parti questo per 3, ne riesse 77, il quale partito per el suo minor numero che è 7, ne riesse 11, così
tu hai

tu hai il primo ordine il quale metterai in figura così,

4 6 2	7, 1 1, 7 7 primo ordine.
mitta 2 3 1	3
terzo 7 7	2
1 1	

Dopo dirai per formare il secondo ordine 3 fia 7, fa 2 1, & 3 fia 1 1, fa 3 3, & 3 fia 7 7, fa 2 3 1, come vedi qua sotto.

7 1 1 7 7
3 2 1 3 3 2 3 1
2

Similmente dirai 2 fia 3, fa 6, & 2 fia 7, fa 1 4, & 2 fia 1 1, fa 2 2, & 2 fia 7 7, fa 1 5 4, & 2 fia 2 1, fa 4 2, & 2 fia 3 3, fa 6 6, & 2 fia 2 3 1, fa 4 6 2, che è numero presupposto: come vedi qua.

4 6 2	7, 1 1, 7 7
2 3 1	3, 2 1, 3 3, 2 3 1
7 7	2, 6, 1 4, 2 2, 1 5 4, 4 2, 6 6, 4 6 2
1 1	

Secondo esempio.

Non senza giusta causa gli astronomi diuifero la circonferenza de la terra, & i cieli in parti ò sia gradi 3 60. Et la ragione sua penso che fu, perche esso numero haueua in se molte parti aliquoti, come hora al effetto il vedrai. Parti 3 60 per mita, ne rieße 1 80: parti 1 80, per mita, ne rieße 90: parti ancora 90, per mita, perche mentre tu poi partire per mita, sempre lo deui vsare, quando non si puo: parti poi per terzo, ò quinto, ò settimo numero. Si che partito 90, ne rieße 4 5, il quale perche non si puo partire per mita senza far mezzo, parti per terzo, & ne rieße 1 5. Et questo partito per terzo, ne rieße 5, il quale non è partibile saluo che per vno. Pero per non tornar à dietro, finirai li partimenti, come vedi qua.

3 60
1 80
90
4 5
1 5
5

Da questo tu conosci, che tre fiate tu hai partito per mit-
ta, & due fiate per terzo : per il che incominciando da li piu
piccioli numeri, li moltiplicarai tre fiate per 2. Et finalmente
poi per 3, come vedi qua sotto,

$$\begin{array}{r} 3, 5, 15 \\ 2 \\ \hline 6, 10, 30 \end{array}$$

A questa somma vi vnirai gli numeri gia moltiplicati,
dandoli di piu il numero de la moltiplicazione cosi,

$$\begin{array}{r} 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 \\ 2 \\ \hline \end{array}$$

Il simile fa in questa terza moltiplicazione.

$$\begin{array}{r} 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 \\ 2 \\ \hline \end{array}$$

Finite le tre moltiplicazioni del 2, moltiplica per 3, &
hauerai le 24, parti aliquote di 360.

Incominciando poi da 1, & notando sempre il seguente
numero infino à 360, hauerai in queste due vltime linee de
numeri, tutte le 24, parti aliquote.

$$\begin{array}{r} 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30, 36, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360 \\ 3 \\ \hline 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120 \end{array}$$

REGOLA DE MISTIONI

in generale.

Le mistioni si fano di varie cose, come ori, & argenti di
diuerfi caratti: similmente di vini, & grani di variati precij, &
altre cose infinite. Et di qual si voglia di queste cose in specie
se ne puo con la seguente regola mescolare due, ò tre, ò qua-
tro : & piu insieme senza perdita veruna, per che come ve-
drai, tu puoi fare le mistioni del precio che à te piacerà, &
con guadagno : per che à le fiate vn' oro, ò vero argento
d'vna ligga non hauera ricapito, & variato d'altra ligga fara
vendibile, & cio ch'io dico de gl' ori, dico al simile de vini, ò
altra cosa i quali variando di precio, trouano miglior ricapi-
to. Et accio che intendi bene questa regola, ti darò da tre, à
quattro esempj di simili di numero : per che secondo che se
varia il numero de le cose che voi mescolare, bisogna anche
varia

variare la regola: come ne i seguenti esempij vedrai. Et mi imagino, che hauesti tu orifice del argento à 6, danari, & di quello di 12, danari, & che ne volesti fare di quello da 8, danari, per qualche tuo lauoro piu espediente, fa adunque cosi, Coglie la differenza del maggior numero, & sotto scriuella al minore, & quella del minore al maggiore: cio è la differenza che fara da i primi numeri, à quello che voi formare di questa maniera,

6		12
		8

La differenza da 12, à 8, si è 4, li quali nota sotto al 6, & la differenza da 6, à 8, si è 2, nota sotto al 12, cosi hai formato onzie, ò sia marchi 6, cio è pigliandone 2, del argento à 12, d. & 4, del argento à 6, d. fa 6, che valeno tanto, quanto valeuano di prima messedate con l'altre ligge: come ne la sua figura,

6		12
		8
4		2

Secondo esempio di tre cose.

Hora facciamo presupposto, che volesti di vn' vino del valore di fiorini 5, il secondo di fiorini 7, il terzo di fiorini 9, formarni vno del valore di fiorini 6, descriue prima la figura di questa maniera, 5 | 7, 9, precij de vini che voi mescolare.

5		7, 9
		6

Il che fatto, nota la differenza che è da 5, à 6, sotto il 7, & 9, & la differenza chi è da 9, & 7, à 6, sotto il 5, cosi.

5		7, 9
		6
3		1, 1

I

Presupposto sopra di cio che ne volesti fare stara 6, del vino di fiorini 6, la cosa resta fatta pigliandone 1, stara del vino di valore de fiorini 9, & stara 1, di quello di 7, & stara 4, del vino che vale fiorini 5. Ma diamo il caso che ne volesti formare solo stara 3, ti bisogna seruirte de la regola del tre, dicendo, lo ho formato stara 6, se adunque 6, mi da 3, quanto

f 3 4, &

4, & 1, & 1, così fatti questi tre conti ti riefse la figura di questa maniera.

$$\begin{array}{r|l} 5 & 7, 9 \\ \hline & 6 \\ \hline 2 & \frac{7}{1}, \frac{9}{1} \end{array}$$

Per il che pigliando del primo stara 2, & del secondo vno 1, & similmente del terzo ti riefse l'intento tuo.

Esempio terzo.

Per che io dubito che potresti cadere facilmente in qualche errore, nel pigliare le differenze che sono fra i numeri, & notarle sotto à vno numero impertinente: come hano fatto alcuni altri scrittori, il cui nome tacerò, per non esser officio di christiano di macchiare l'altri fama, replicarò ancora i medemi precij de vini, ma ne formarò vno diuerso di precio da l'altro sudetto: come vedi in figura

$$\begin{array}{r|l} 5, 7, & 9 \text{ precij.} \\ \hline & 8 \\ \hline 1, 1, & 3 \\ \hline & 1 \text{ differ.} \end{array}$$

Et poi conoscere, come le differenze che erano sotto al 5, ne l'altro esempio, hora sono sotto al 9, & quelle del 9, sotto al 5, & 7, ne mistenderò più al longo: per che hauendo bene inteso il secondo esempio, con facilità capirai questo terzo, il quale non è da quello molto differente.

Esempio quarta.

Quando di quattro vini, ò grani di diuersi precij vorrai far mescolanza, per accommodarti del precio con vtilità come questi.

$$\begin{array}{r|l} 5, 7, & 9, 10 \text{ precij.} \\ \hline & 8 \\ \hline 2, 2, & 3, 3 \\ \hline 1, 1, & 1, 1 \text{ differenze.} \end{array}$$

Ti bisogna come di prima pigliare la differenza che è da 5, à 8, & notarla sotto al 10, & 9, & la differenza dal 10, al 8, notarla sotto à 5, & 7, il che fatto pigliare la differenza che è da 7, al 8, & notarla similmente sotto al 9, & 10, & quella del 9, al 8, sotto al 5, & 7, come ne la sudetta figura poi vedere: così tu hai formato stara 14, come pareffe cogliendo

gliendo tutte le differenze, liquali à ragione di fiorini 8, il staro vale fiorini 112, & tale similmente ne riefse la somma, pigliando del primo vino stara 3, & del secondo 3, di terzo 4, & vltimo 4, ma se non volesti mescolarne piu di stara 6, opera con la regola del tre, come da principio ti ho detto.

Esempio quinto.

Ti dono ancora questo, il quale non è molto differente dal antedetto, ma accio resti bene instrutto de la regola: & sta così,

5, 7, 8,		10
		9

In questo coglie la differenza che è dal 10, al 9, & nota la sotto al 5, 7, & 8, dopo coglie la differenza che è dal 5, al 9, che sarà 4, & nota la sotto al 10, similmente farai de la differenza del 7, & 8, al 9, come qua in disegno si vede.

5, 7, 8,		10	precij.
		9	
1, 1, 1,		4	differenze 10.
		2	
		1	

Se fossero da mescolare sei sorte di ligge d'argento, ò altro, sotto scriue tutte le differenze: come vedi qua in figura.

argenti di	5, 7, 8,		10, 11, 12.
3, 3, 3,			4, 4, 4.
2, 2, 2,			2, 2, 2.
1, 1, 1,			1, 1, 1.

De le mistioni in speciale del argento.

Se hauesti vno biglione d'argento de marchi 7, & ogni marchio hauesse in se onzie 5, d'argento fino, & volesti saper, quanto argento fino haueria poi ogni marchio, sondendolo con marchi 21, d'arame: fa così, somma tutti li marchi, che saranno 28, poi multiplica 5, fia 7, fa 35, & questi parti per 28.

Esempio secondo.

Presupposto che hauesti tre lingoti, ò biglioni d'argento, &
il primo

il primo pesasse marchi 11, & tenga in se onzie 9, d'argento fino per ogni marchio.

Il secondo pesi marchi 15, & tenghi in se onzie 8, per marchio.

Il terzo pesi marchi 24, & tenghi in se onzie 6, per marchio: volendo poi saper, quante onzie d'argento fino hauerà poi ogni marchio, fondendolo tutto à meschio, fa così, moltiplica tutte l'onzie per i suoi marchi, & fatta la somma parti per il numero de marchi: come vedi qua sotto,

	9		marchi.
	8		11
	6		15
onzie	23		24
			50
23			*
50	partimēto	1150	
1150	somma.	23	onzie per ogni marchio.
		500	

Dopo che hò incominciato à ragionare de gl' argenti, & ori, ti diro alcune cose di essi, lequale non mi parono al presente fuori di proposto. Et prima deui sapere, che l'oro va salendo in piu finezza, infino à caratti 24, auenga che alcuni scrittori dicano, che non si troua mai in quella perfetta finezza. Et questo di caratti 24, si è oro purissimo, senza veruna ligga d'argento, ne rame. Quel oro che è poi di caratti 23, à in se grani 23 d'oro per ogni danaro, & vno grano di ligga: che cosa sia grano tu l'hai veduto in principio ne la regola di sommare pesi, similmente l'oro di caratti 22, ha in se grani 2, di ligga per danaro, & quello di 21, ne ha 3, & quello de 20, ne ha 4, va seguendo. I modi poi di conoscere queste finezze, farano la toca de gl' orefici, & l'aqua forte da partire, ò vero il cimento reale, il quale come si faccia, poi che lo sano tutti gl' orefici, à loro ti rimetto, per esser cosa fuori di proposto: ben ti auisò che l'oro, & argento sempre à la toca dimostrano, d'essere alquanto di piu finezza che non sono.

L'argento poi va salendo in finezza, infino à dinari 12, & quello

quello si è puro, & finisimo, auenga similmente che alcuni habbino oppenione, che non possi mai agiugnere à tanta finezza. Quel argento adunque di 11 danari, ò sia caratti ha in se grani 22, di fino per ogni danaro, & grani 2, di ligga. Et così l'argento di 10, danari, ò caratti ha in se grani 4, di ligga per danaro, va discorrendo. Il modo poi di conoscere la sua finezza sarà la copella.

De i suoi valori in speciale non ne parlo, per la diuersità de pesi, & monete. Solo ti diro in generale, che onzie 12, d'argento fino, valeno vna d'oro puro. Vn' altro giorno à contemplazione del Signor Gio. Anthonio Codazzio mio nepote, ti diro alcune altre cose belle, con vno trattato che farò di pesi, misure, & monete antiche cauato dal Budeo de asse, & dal Signor Alciato, & altri. Per hora farò fine al ragionamento de metalli, detto che ti hauero, che l'oro pesa piu de l'argento quasi del doppio, & la sua proporzione si è come 16, da 9.

Regola del falso.

Tante sono le regole del falso, che à volerle tutte annumerare, troppo lungo farei nel mio ragionamento, il che sarebbe contra la mia prima deliberazione, poi che vorrei poter ridurre ogni cosa sotto à vn sol capo. Si chiama adunque questa la regola del falso, non per che ti insegni il falso, ma per che con essa si può conoscere il falso, & si fa in questo modo,

Di ogni questione à te proposta, la quale con questa regola si possi sciogliere, fingeti quel numero che desideri di saper, come se ben lo sapesti, metendo al suo luogo qual si voglia numero, & con quello procede secondo la ragione dell'esempio, cauando vno numero da l'altro, infino che gioghi ad alcuno certo numero proposto ne la questione, il quale se col finto già numero potrai trouare, quello sarà il vero fine che cercaui.

Come in esempio vno ha vna botte con tre canelle, & con la prima & piu grossa aperta si vota in vna hora, con la seconda in hore 2, con la picciola in hore 3. Hora se volesti saper, in quanto tempo si votarebbe, aprendo tutte le tre canelle.

g Ti

Ti bisogna prima saper, che ogni hora è de minuti 60. Et fingi, che ne la botte fosserò stara 12, di vino, già vedi per la nostra questione, che in vn' hora vscirebbono tutti i duodeci stara per la prima & piu grossa canna: & con la seconda stara 6, & à ragione de la picciola stara 4, che fariano in somma stara 22, auenga che la botte non tenghi ò capisca piu di stara 12, adunque soprauanzano stara 10. Di nuouo finge che in trenta minuti escie per il canal grande stara 6, & per il mezano 3, per il picciolo 2, che sono 11, in tutto, & doueuano esser 12, come sta il problema nostro: vi manca adunque 1, per il che opera per la regola del falso così,

Scrue le differenze.

$$\begin{array}{rcc}
 \text{minuti} & 60 & 10 \\
 & \diagdown & \diagup \\
 & & \times \\
 & \diagup & \diagdown \\
 \text{minuti} & 30 & 1
 \end{array}$$

Dopo multiplica 60 per 1, fa 60, similmente multiplica 30 per 10, fa 300, agiongeui gli 60, fa 360: li quali parti per 11, & ne riessè minuti 32, & $\frac{4}{11}$. Et in tanto tempo dico, che vscira tutto il vino de le tre canne.

Esempio secondo.

Narra Vitruuio al libro nono, & capo 3, che hauendo il Re Hierone fatto voto à i Dei d'vna corona di puro oro, comessè il negozio ad vno orifice, il quale come spesso sogliono fare, tolta vna parte del oro, vi agionse altrettanto argento. Il cui inganno senza guastare l'opera, conobbe benissimo Archimede Siracusano in questo modo: fusc vna massa d'oro puro, del istesso peso che era la corona fatta: & similmente fusc vna massa d'argento puro, del istesso peso. Dopo empiuto bene vno vase d'aqua, in quello messè prima la corona, & raccolse tutta l'aqua che vsci fuori, & pesola, & era libbre 3, & $\frac{1}{4}$ dopo messè la massa del oro nel istessa aqua, & l'aqua che vsci fu libbre 3, & la massa pesaua libbre 5, poi messè la massa d'argento de libbre 5, & vsci fuori del vase libbre 4 $\frac{1}{2}$ d'aqua. Dopo per la regola del tre disse, se 5, me da 3, d'aqua quanta me ne dara il peso di libbre 3, d'oro, così libbre 5, da 3, quanto

quanto 3, che sono $\frac{2}{3}$ ò vero 1, & $\frac{1}{3}$

Dopo disse se vna massa d'argento di ff. 5, me da ff. 4 $\frac{1}{2}$ d'aqua, quanto me dara ff. 2, per l'istessa regola del tre, così ff. 5, dano ff. 4, $\frac{1}{2}$ quanto ff. 2, $\frac{1}{2}$ che sono $\frac{2}{3}$ ò vero 1, & $\frac{1}{3}$,

Sommando poi tutti due i numeri fano 3, & $\frac{1}{3}$ ff. d'aqua & doueuano essere ff. 3, & $\frac{1}{3}$ haueua adunque trapassato il segno di $\frac{1}{10}$ come cogliendo le differenze conoscerai al modo qua sotto scritto.

$$\begin{array}{r} 17 \\ 3 \frac{1}{3} \quad 12 \quad 5 \\ 3 \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{3} \\ \hline 20 \end{array}$$

Bisognaua adunque per hauer trapassato de $\frac{7}{10}$ che si ritraffe. Pero fece vna seconda fittione minore, cio è che l'oro de la corona pesasse ff. 2, & l'argento 3, & con la regola del tre disse se ff. 5, d'oro dano ff. 3, d'aqua quanto 2, che sono 1, intero & $\frac{1}{5}$.

Di nuouo disse, se ff. 5, d'argento dano ff. 4, $\frac{1}{2}$ quanto 3,

$$\begin{array}{r} 3 \\ 13 \frac{1}{2} \end{array}$$

partite per 5, dano ff. 2, & $\frac{7}{10}$ hora giongendo insieme questi due numeri così,

$$\begin{array}{r} 45 \\ 10 \quad 35 \\ \frac{1}{5} \quad \frac{7}{10} \\ \hline 50 \end{array}$$

Sono poi in somma 3, ff. intiere & $\frac{2}{5}$ ma per ché doueuano essere 3, $\frac{1}{2}$ d'aqua come metendo la corona nel aqua erano vscite, trapasso il segno di $\frac{1}{10}$ come vedi qua: da le differenze leuando 3, & $\frac{2}{10}$ da ff. 3, & $\frac{1}{2}$ d'aqua.

$$\begin{array}{r} 26 \\ 36 \quad 10 \\ \frac{9}{10} \quad \frac{1}{4} \text{ che sono } \frac{11}{20} \\ \hline 40 \end{array}$$

Opero adunque per la regola, multiplicando $\frac{11}{12}$ per 3, & ne vſci $\frac{11}{12}$. Dopo multiplico $\frac{11}{12}$ per 2, & ne vſci $\frac{11}{6}$ le quale leuate da $\frac{11}{12}$ auanzano $\frac{1}{12}$. Di piu leuo $\frac{1}{12}$ da $\frac{11}{12}$ auanzo $\frac{1}{12}$. Partendo poi $\frac{1}{12}$ per $\frac{11}{12}$ ne vſci $\frac{1}{11}$ cio è ff 4, & $\frac{4}{11}$. Erano adunque ne la corona ff 4 $\frac{4}{11}$ d'oro & $\frac{4}{11}$ d'argento per com pire la ſomma di ff 5.

Et la proua ſara queſta, ſe ff 5 d'oro dano ff 3 d'aqua, quanto 4 $\frac{4}{11}$ d'oro : ſano ff 2 $\frac{4}{11}$ d'aqua. Di nuouo dirai ſe ff 5 d'argento dano ff 4 $\frac{4}{11}$ d'aqua, quanto $\frac{4}{11}$ ſano $\frac{4}{11}$ di liura, li quali congiongi con le 2 $\frac{4}{11}$, ne rieſſe ff 3 & $\frac{4}{11}$ d'aqua, quanto vſci d'aqua, quando ſi meſſe la corona nel aqua.

Ma in cio nota, che auenga ti habbi detto, che Archimede fuſe due grande maſſe d'oro, & argento, che qualunque vorra fare ſimile proua, baſtara ogni picciola quantita d'oro, & argento.

Alcune queſtioni d'Arithmetica.

Fu gia vno che piglio il carico di fare vno pozzo per ſcutti 36, & profondo brazza 16. Ma quando n'hebbe cauato brazza 6 volſe eſſer pagato. Hora vorrei ſaper, quanto gli douea dar il patrone, per le brazza 6 cauate.

Fa coſi, Conta quanti numeri ſono da vna infino à 16, & trouarai che ſono 136 brazza, poi conta quanti numeri ſono da 1 infino à 6, che ſono 21, dopo multiplica 21 ſia 36, ne rieſſe 756 li quali parti per 136, & trouarai che il maefstro del pozzo ha da riceuere ſcutti 5 & $\frac{4}{11}$ di ſcutto per l'opera de le 6 brazza cauate.

Queſtione ſeconda.

Vno à poſto 100 pomi diſcoſti vno paſſo l'vno da l'altro, & vna ceſta diſcoſta vn paſſo dal primo pomo. Se voleſti poi ſaper quanti paſſa ſara colui cogliendo detti pomi vno à la volta, & portarli ne la ceſta, per ſaper quanto lontano tu potreſti caminare fra tanto, ſa coſi, Piglia il primo, & vltimo numero, cio è 100 & 1, fa 101, dopo multiplica 101 per 100, fa 10100, & tanti paſſa ſara colui che coglie i pomi, ſenza il tempo che ſi perde piegandoſi à terra per pigliare il pomo. Per il che fra tanto tu potreſti caminare tre miglia.

Queſt

Questione terza.

Vna torre è alta pic 200, & il suo fosso che la circonda pic 60, hora volendo fabricare vna scala, che dal argine del fosso possi agiongnerè à la cima de la torre, farai così, Multiplica 200, per 200, fa 40000, similmente 60, per 60, fa 3600, liquali somma con li 40000, fa 43600, dal qual numero caua la radice quadrata che sarà 208, $\frac{4}{7}$, quasi, & tanta bisogna che sia la longezza de la scala.

Questione quarta.

Vno mercante ha da riceuere gli sottoscritti danari in diuersi termini come qua.

Prima scutti 40, in mesi 6.

Piu scutti 50, in mesi 8.

Piu scutti 60, in mesi 10.

Et scutti 70, in mesi 12.

Et esso mercante vorrebbe fare vn sol termine, il quale pero non gli fosse di interesse alcuno. Se voi saper di quanti mesi si deueria fare il termine, fa così: multiplica i primi scutti con il primo termine fa 240. Il simile farai de tutti gli altri: & il secondo fa 400. Il terzo fa 600. Il quarto fa 840; dopo somma tutti questi numeri insieme, fano 2080, & la somma de scutti si è 220. Hora parti 2080, per 220, ne rieße 9, mesi, & de gli 100, che auanzano che sono giorni multiplicandoli per 30, farano 3000, liquali parti ancora per 220, ne rieße giorni 13, multiplicando similmente gli 140, restanti ne rieße l'hore: Così dirai che si douerebbe fare il termine di mesi 9, & giorni 13, & hore.

Questione quinta.

Se hauesti da fare vno pagamento ad alcuno, & fosse in tua liberta di darli ò scutti, ò moneta, & volesti saper de quali gli deui sborsare per meno perdita: poniam caso che i scutti vagliano grossi 120, & i testoni 20, & à Millano il scutto vaglia 140, grossi, & il testone 24, multiplica 140, per 100, fa 14000, liquali parti per 120, ne rieße 116 $\frac{4}{11}$ di nuouo multiplica 24, per 100, fa 2400, & parti per 20, ne rieße 120, & per che 120, è piu, sarà meglio sborsare i testoni.

LIBRO QVARTO,

DE LE ESTRAZZIONI

DE RADICI.

*Et prima de le quadrate.*

ESTRARE la radice quadrata di vn numero, si è raccogliere vn numero con tale artificio, che dopo multiplicato per se stesso formi quadrato il numero à te proposto, come in esempio volendo la radice quadrata di 36 ti bisogna con arte ritrouare il 6, per che 6 fia 6, fa 36. Et questo 36, si chiama numero quadrato, per che da la multiplicazione di due altri numeri cio è 6, & 6, si forma: così auiene à tutti gl'altri numeri quadrati, i quali hano vna certa somiglianza con i quadrati geometrici, come ne fa piena fede la seguente figura.



Radice quadrata si è il numero il quale da la sua istessa multiplicazione forma vno numero quadrato: come 3, si è la radice quadrata di 9, per che 3, fia 3, fa 9. Hora ti bisogna saper, che le radici semplici sono noue, & altre tanti i suoi quadrati, come vedi quiui apresso.

radici. quadrati.

1	1
2	4
3	9
4	16
5	25

radici

radici.	quadrati.
6	36
7	49
8	64
9	81

Hauendo bene intese le sudette, il modo poi di ritrouare le radici de gl' altri maggior numeri fara questo.

Esempio.

Se'l ti fosse proposto, questo numero de soldati à te fargiente, cio è 7450, i quali bisognasse condurli in campagna, accio gli sapesti subito mettere in bataglia, quadra accadendo che incontraste l'inimico, ti bisogna innanzi che partirti del logiamento, prima cauare la radice quadrata di tal numero di soldati cosi.

Prima notrai il numero di due in due ziphre cosi incominciando da l'ultima come qua 7450, & nota che questa regola si serue sempre di questo numero 20, come vedrai al effetto, notati gli ponti come ti ho detto, dirai la radice quadrata di 74, che sono le due prime ziphre si è 8, & auanza 10, liquali notrai sopra il 74, cosi,

10

7450

Dopo nota l' 8, à parte agiongendoui il 20, del quale sempre come ti ho detto si serue questa regola, come vedi
8 — 20 — 6.

Il che fatto multiplica 20, per 8, fa 160, poi parti gli 1050, che ti sono auanzati nel primo conto, per 160, ne riecse 6, liquali notrai cosi al tuo conto 8 — 20 — 6.

Dopo multiplica 6, via 6, fa 36, liquali cauandoli da gli 90, che ti sono auanzati dal partimento, resta à 54. Così da questo conto pigliando l' 8, & il 6, fano 86, tu dirai che questo numero è la tua radice quadrata di 7450, & ti sono auanzati 54, soldati, liquali dopo che haueraì posto tutti gli altri in bataglia à 86, per ogni filla, questi gl' adoprerai à quello che à te parra piu espediente, secondo il sito del luogo.

Ma se'l numero di questo esempio fosse maggiore, al'hora
bifogn

bisognara replicare la regola di ponto in ponto notato: come se volesti la radice di questo numero 745030, espedite gia le quattro prime ziphre cosi stara l'esempio.

$$\begin{array}{r} 5 \\ 2054 \\ 745030 \\ \hline 8 \quad \text{---} \quad 20 \quad \text{---} \quad 6 \end{array}$$

Essendo di bisogno ricercare la radice di 5430, farai così, Moltiplica la prima radice trouata, che è 86, per 20, fa 1720, & questo fara il tuo partitore, col quale partirai gli 5430, & il quoziente fara 3, per che potrai conchiudere che 863, si è la radice quadrata di 745030, & auanzano $\frac{110}{1712}$ de le quale hora ti darò il modo similmente come cauarni la radice.

Il modo di trouare la radice quadrata di rotti.

Per che ne i rotti sempre vi concorreno due numeri, cio è il numeratore & il denominatore, pero è di bisogno cauare la radice di ogniuno à parte: & similmente la radice del numeratore fara numeratore, & quella del denominatore del denominatore. Come in esempio $\frac{9}{16}$: la radice adunque del numeratore fara 3, & quella del denominatore 4: pero notando il 3, sopra il 4, fa $\frac{3}{4}$, che fara la radice di $\frac{9}{16}$.

Ma se à caso ti incontraste in vno numero rotto, che non fosse di natura quadrato come $\frac{7}{11}$ la radice del 7, farebbe 2, & quella di 11, fara 3, così la radice di $\frac{7}{11}$ fara $\frac{2}{3}$ auenga che non sia la sua vera radice, per che ne i numeri che di sua natura non sono quadrati, gli è impossibile trouarla perfetta.

La prona.

Moltiplica la radice gia trouata per se stessa, & agiongueui il restante, se al'hora ne riesse la somma da la quale tu ne hai cauata la radice, fara giusto il conto, altrimenti non.

De le radici cube.

Cubo si è vno corpo di vna istessa longhezza, larghezza, & altezza: cio è quadrato da tutti i latti, come questo.



Estrarc

Estrare adunque la radice cuba di vno numero altro non è, si non che artificiosamente trouare vno numero, il quale multiplicato per se stesso, & di nuouo con la istessa multiplicazione multiplicato, ti formi vno cubo, se pure cubo sarà il numero: per che si, come ti ho detto, tutti i numeri non sono quadrati, così ancora tutti non sono cubi. La radice cuba si è quello numero che così multiplicato ti forma il cubo: come in esempio 3, sarà la radice cuba di 27, come ne la suddetta figura si vede: per che 3 fia 3, fa 9, & 3 fia 9, fa 27, che è la figura cuba.

Il modo hora di trouare questa radice, te lo diro, ma prima ti dico, che si come ne i quadrati numeri vi sono noue radici semplici, così in questi vi sono noue primi numeri cubici, & altrettante radici le quale sono queste,

radici.	cubi.
1	1
2	8
3	27
4	64
5	125
6	216
7	343
8	512
9	729

Per che troppo noioso mi pareua, hauer sempre da ricercare le radici de primi numeri, pero mi è parso cosa molto al proposito agiongerui questa tauola, de la quale ti potrai seruire, sempre che ti occorrera, di voler la radice d'alcuno di questi numeri cubici. Ti bisogna ancora sapere, che si come le radici quadrate si seruono di questo numero 20, da per tutto, così le radici cube si seruono di questi due 300, & 30. Et si come ne le estrazioni di radice quadrate si notano con vno ponto le ziphre di due in due, così in questi numeri cubici si notano di tre in tre così 238328, con i ponti sotto incominciando sempre da l'ultima ziphra.

h. Esempio

Esempio.

Se vorrai estrarre la radice cuba di 238328, guarda ne la sudetta tauola, qual è la radice di 238, che sono le tre prime ziphre, & per che non vi è precisa, acostati al numero più vicino, che sarà 216, il quale cauara da la somma così,

$$238328$$

$$216$$

$$\text{auanza } 22328$$

Et per che la radice cuba di 216, si è 6, pero notalo per il tuo quozziante. Dopo multiplica 6, in se fa 36, liquali similmente notarai, come qua con i numeri proprij de la regola.

$$6 \text{ — } 30$$

$$36 \text{ — } 300$$

Poi multiplica 300, per 36, ne ricsse 10800, con liquali partirai il numero che ti auanzo, cio è 22328, per trouare il secondo quozziante: & da questo partimento ne ricsse 2, & auanzano 728, pero nota il 2, dopo il 300, così.

$$6 \text{ — } 30$$

$$36 \text{ — } 300 \text{ — } 2$$

Di nuouo multiplica 2 sia 2, fa 4, & due volta 4, fa 8, li quali similmente notarai così,

$$8$$

$$6 \text{ — } 30 \text{ — } 4$$

$$36 \text{ — } 300 \text{ — } 2$$

Il che fatto, multiplica 10800, per il secondo quozziante cioe 2, & ne ricsse 21600, dopo multiplica 30, per 6, fa 180, il quale ancora multiplica per 4, & ne ricsse 720: hora somma questi due numeri insiema cioe 21600, & 720, agiongendoui l'8, che sta sopra il 4, farà 22328, il quale voderà il numero che auanzo da la prima sottrazione. Così pigliando il primo & secondo quozziante del sudetto esempio cio è 6, & 2, fa 62, che sarà la radice cuba di 238328.

De le radici cubiche i rotti.

Quando à caso ti auanzasse qualche numero rotto come questo $\frac{6}{11}$, prima per la regola che hora ti ho dato troua la radice cuba del numeratore, & ne ricsse 2, similmente quella

quella del denominatore & ne rießeta 3, così mettendo del numeratore la radice al suo luogo ne viene $7\frac{1}{2}$ li quali sono la radice cuba di $\frac{8}{27}$.

Prima che de la proua ti parli, auisaroti che si ne i numeri quadrati, come cubi, sempre che nel partire non ti puo riusfire numero alcuno, al hora nora vno o, per quoziente, & di nuouo va seguendo la regola.

La proua.

Con facilità trouarai la proua del tuo conto fatto, se moltiplicarai la radice cuba in se, & di nuouo moltiplicarai la istessa moltiplicazione per la radice, per che se ne rieße il numero, del quale hai cauata la radice, sarà giusto il conto, altrimenti non, come dal sudetto esempio puoi apparare.

$ \begin{array}{r} 2162 \\ \times 62 \\ \hline 1294 \\ 3722 \\ \hline 3844 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 3844 \\ \times 3844 \\ \hline 62 \\ 7688 \\ \hline 23064 \\ \hline 238328 \end{array} $
	seconda moltiplicazione somma

Il modo di suputare tre corpi spherici, come balle d'artelaria, & farne vno de la capcità di quegli tre dinerfi fra loro.

Moltiplica la circonferenza d'ogniuno in se, dopo somma tutti gli tre numeri insieme, poi cauane la radice quadrata, & hauerai la giusta circonferenza de la quarta balla, o sia corpo spherico.

Sia in esempio tre corpi, il primo habbi di circonferenza palmi 3, il secondo 4, il terzo 5, moltiplicato il primo in se fa 9, il secondo fa 16, il terzo 25, liquali gionti insieme fano 50, & la radice quadrata di 50, è 7, & $\frac{1}{2}$ & tanto sarà la circonferenza del quarto corpo spherico, o sia balla.

IL FINE DEL LIBRO DE LA
ARITHMETICA.

h

h

TAVOLA DE LE COSE CHE
 si contengono nel libro presente
 d'Arithmetica.

LIBRO PRIMO.		LIBRO TERZO.	
Che cosa sia Arithmetica, numero,		De compagnie de danari.	32
& carateri.	Pagina 6	De compagnie de bestiami.	34
De luoghi de numeri, & suo valore.	6	De barati.	34
Del somare prima regola.	8	De guadagni & perdite.	35
Del sottrare.	11	Come si conoscono le differenze de pesi.	35
La sua prona.	12	Del biseftro.	36
Del multiplicare.	12	Del aureo numero.	36
Del multiplicare in altro modo.	14	De la patta.	36
Come si possi abreniare la multiplicazione.	15	De la congiunzione del Sole & Luna.	37
La sua prona.	15	Di alcune propriet� di numeri.	37
Del partire.	15	De meriti et compensazioni.	37
Di alcune abreniature.	18	In quanti anni ogni merito si faccia uguale al principale.	39
La sua prona.	18	De futuri.	40
De le progressioni.	19	De giuochi.	40
Progressioni de numeri continui & discontinui.	19	De giuochi di memoria.	41
De le progressioni Geometriche.	20	De le parti aliquote.	42
La regola del tre.	21	Regola de mistioni in generale.	44
La regola del tre conuersa.	22	De mistioni in speciale d'argenti & ori.	47
LIBRO SECONDO.		La regola del falso.	49
De i numeri rotti.	22	Alcune questioni d'Arithmetica.	52
Del variare de rotti.	23	LIBRO QUARTO.	
Del ridurre in breuit� i rotti.	23	De l'estrazioni de radici quadrate.	54
Del sommare de rotti.	24	De le radici quadrate de rotti.	56
De sommare intieri e rotti.	25	De radici cube.	56
Del sottrare de rotti.	25	De le radici cube ne i rotti.	58
Del sottrare rotti da intieri.	26	La sua prona.	59
Del multiplicare de rotti.	26	Il modo di trouare per via di Arithmetica la circonferenza d'vno corpo spherico da la proporzione d'altri tre corpi.	59
Del multiplicare intieri e rotti.	27		
Del partire de rotti.	28		
Del partire intieri & rotti.	29		
La regola del tre in rotti.	31		

IL BREVE TRATTO
DI GEOMETRIA DEL
SIG. GIO. FRANCESCO
PEVERONE DA
CVNEO.*



*Sed famam extendere factis
Hoc virtutis opus.*

IL BREVE TRATTO

DI GEOMETRIA DEL

SIG. GIO. FRANCESCO

LEVERONE DA

CHIAVO.



LIBRARY OF THE
MUSEO



AL ILLVSTRISS. SIG.

PRESIDENTE DI ASTE MIO

SIGNOR OSSER-

VANDISS.

*
Il Sig. Gio. Francesco Osasco.



E chi ha buono animo di pagare il suo debito, e non può, è veramente degno d'iscusazione: quāto maggiormente debbo esser iscusato io apresso di v. s. il quale ancor che in me sempre sia stato il buono animo di vscire di debito, non possendo satisfarlo: confesso palesamente l'obbligo di che gli sono tenuto, si per gl' infiniti benefici che per mera sua cortesia oltra ogni merito mio m'ha fatti, come ancora nel farmi degno de l'amicizia sua: da la quale non poco frutto ho ritratto. Per che essendo voi dotato da la madre natura di bello ingegno & dal continuo studio di tutte l'arti liberali ornamento del vostro sangue illustriſs. raccio la prudenzia, la giustitia, e la magnanimita compagne di tante virtu che in voi sono raccolte. Queste cose aggiunteui l'amorreuoli esortazioni, come sperone, m'hanno spinto al studio de l'Arithmetica, Musica, Architettura, Pittura, Astronomia, & finalmente di questa Geometria: conoscendo quanto necessaria è quanto gioueuole sia a tutti noi, che certo senza questa nobilissima scienza sariamo ogni hora per le diuisioni de campi a le mani, e ne i litigij trauagliati: e senza essa sarebbe il mondo priuo de la diletteuole Astronomia,
del

del vile Architettura, de la suaue Musica instrumentale, e de l'allegra Pittura. Ne so come faria senza questa il considerato bombardiere, à terminare i suoi tiri, che hor violentamente, & hor per corso naturale in alto sagliono, e scendono al basso. E come si congiugneriano i lauori del faticoso legnaiuolo? che proporzione daria l'ingegnoso maestro à le ruote de suoi horology? Come riuscirebbero l'opere del aueduto liuelatore? del sottile orefice? & del dotto Stampatore? & il prudente ingignieri come saprebbe misurar i luoghi inaccessibili, come canuar le piante de paesi & città? ne formar bastioni, cauaglieri, e trinciere, con le quali si difendono le fortezze da fieri nemici? Pero ben disse Aristippo filosofo (secondo che recita Vitruuio) quando fu cacciato da la tempesta di mare nel porto di Rhodi, subitò che hebbe vedute alcune figure di Geometria, cominciò à gridare à i suoi compagni, *allegrateui con cio sia che ho degia visto, l'orme de gl'huomini.* Da questa adunque ingeniosa madre de le scienze ha raccolte alcune piu degne cose, e come primo frutto de le mie fatiche, à voi che caggion ne siete dono queste mie primizie; non per pagar con si picciol duono gl' infiniti oblighi che vi ho, ma per dimostrarui il disio grande che ho, di pagarueli con viui effetti sempre che mi si presentara occasione di posserlo fare. Fra tanto humilmente me li raccomando.

State sano. Da

Cunco del.

1556.

D. V. S. Illustriß. humile seruitor Gio. Francesco
Peuerone da Cunco.

✱

LIB



LIBRO PRIMO DI GEOMETRIA.



Et prima che cosa sia Geometria.



GEOMETRIA ancor che piu cose possi significare nondimeno propriamente gli è scienza & arte di misurare la terra, trouata da gli Egizij per saper dopo che le inondazioni del Nillo haueuano posto sortosopra i campi dare ad ogniuno quello che era suo de prima. Dopo l'hanno i nostri antiqui di modo ampliata che al presente di essa se ne seruiano ad infiniti vsi in modo che non vi è quasi scienza ne arte veruna che non habbia bisogno del suo appoggio. Però hauendo per adietro trattato de la Arithmetica, la quale (come è la natura de le scienze di esser concatenate insieme) è quasi vna istessa cosa con la Geometria, mi è parso cosa molto conueniente seguendo l'ordine dirti con breuita quanto farà à me possibile quanto à la cognizione di essa farà di bisogno.

De suoi principij.

Il principio di Geometria si è la cognizione de le sue quantita continue le quali sono linee, angoli, superficie, & corpi sodi, regolari, & irregolari.

Che cosa sia ponto.

Ponto, come dice Euclide nel suo principio, è quello che non ha parte in se, cio è che non si puo partire.

i De

De la linea.

Linea si è vna lunghezza senza larghezza gli cui termini sono due ponti & questa puo essere di vndeci sorte. Et la prima fara retta cio è vno sotil tiro dritto da vno ponto à l'altro come questa che seguita.

La seconda fara Piegata si cui termini al mezo nõ conuengono come.

La terza sorte si è di linee Pararelle lequalle tirate sopra vno piano, auenga che andassero in infinito, mai si possono basciare, per essere equidistanti come le infrascripte due.

La quarta si è linea Perpendicolare cio è che sta à piombo. Et è quella che sta tetta sopra altra linea tetta & forma due angoli retti & vguali come.

La quinta è detta Flexuosa per che in torti giri si va alongando come questa.


La sesta è linea Spirale per che dal suo printipio infino al vltimo termine sempre circularmente si va agirando come questa.

La settima Diametrale è quella che passando per il centro del circolo il parte in due parti vguali come questa.




La


La ottaua è detta Eliaca per che in modo di spira si va agitando à torno di qualche corpo.




La nona Diagonale è quella che passando per i corpi de molti lati gli parte in due parti vguale come la seguente.



La decima è detta Hypothumissa per che non sale retramente sul piano come questa.




L'ultima è Circolare chiamata ò vero circonferenza del circolo come la presente.



De gl' Angoli.

Angolo propriamēte è la scambieuole inclinazione non diretta di due linee stese sopra vno piano de li quali ve ne è di otto forti.

Il primo si chiama Angolo retto il quale è formato da linea retta che cade sopra altra retta formando gl' Angoli retti & vguali come.



Angolo Ottuso è quello che è maggiore del retto. Et il suo cōtra diuiso è acuto per che è minore del retto, come questo che seguita.



Angolo Piano è quello che ha vna scambieuale cōgiunzione di due linee sopra vno piano, come questo.




Angolo Rettilineo è quello, che è formato da linee rette, come è similmente il sudetto angolo Piano.

Angolo Coruilineo è quello, che è formato da linee curue, ò sia piegate, come.



Angolo Misto è quello, che da linee piegate, & rette è formato: come.



Angoli di posizione sono.



Angolo Solido è quello, che da piu di due piani, & angoli retti che non sono nel istesso piano, & che ad vno ponto si giontano si forma: come ti rapresenta l'angolo A.



De le Superficie.

Superficie è quella, che ha solamente longezza, & larghezza, gli cui termini sono linee. Et ve ne sono di due sorte, l'vna chiamata Piana, la quale vguualmente giace fra sue linee: l'altra

tra si chiama Curua, ò vero piegata, de la quale ne parlaremo al suo luogo.

De le superficie piane & rette.

Superficie scalena è quella, che ha tre latti inuguali, & vno angolo retto: come questa.



La superficie isoschele è quella, che è formata solo da due latti vguali, & vno angolo retto: come questa.



Superficie osigonia equilatera è quella, che è formata da tre linee vguali, & rette: come questa che ha tre angoli acutti, & se ne troua di tre sorte.



La superficie osigonia scalena è questa.



La superficie osigonia isoschele è questa.




La superficie ambligonia è quella, che ha vno angolo ottuso: come questa.




Superficie quadrata è quella, che è formata da quattro linee rette, & vguali latti: come questa.


Superficie romba è quella, che ha gl'angoli oposti vguali, ma non retti: come questa.




Superficie romboida è quella, che ha gli latti oposti vguali, ma non ha gl'angoli retti: come questa.




Superficie quadrangola è formata da quatro linee, & angoli retti, ma non di vguali latti: come questa.



Superficie trapezia è quella, che ha e latti e angoli inuguali: come questa.



Superficie poligonia, ò vero multilatera è quella, che è formata da piu di quatro linee rette: come questa.



De le superficie curve.

Superficie circolare è vna figura piana, formata da vna sola linea piegata, chiamata circonferenza: come questa.



Superficie semicircular è vna figura piana, formata dal diametro & meza circonferenza: come questa.



Superficie curua, ò vero piegata è quella, che non giace vguilmente fra sue linee: come questa.




Superficie conuexa è quella, che
vualmente non giace fra sue linee,
& è oposta à la curua.



Superficie ouale è quella, che è simigliante
al vn ouo: come questa.



Superficie lenticulare è maggiore del se-
micircolo, & à la figura di lente: come
questa.



De le superficie corporee.

Le superficie corporee ò sono regolari, ò irregolari, ma
prima diremo de corpi regolari.

Corpo adunque è vna quantita longa, larga, & crassa.

Corpo spherale è vno corpo rotondo,
formato da vna sola superficie: come questo.



Tetrahedron corpo è quello, che è for-
mato da quattro triangoli di vuali angoli:
come questo.



Corpo hexahedron, ò vero cubo, è quel-
lo, che è formato di sei superficie quadre co-
me il dado.



Corpo

Corpo octahedron è formato da otto triangoli di vguali latti: come questo.



Corpo dodecahedron è formato da dodeti pentagoni vguali, & equilateri: come questo.



Corpo icosaedron è formato da vinti triangoli vguali, & equilateri: come questo che seguita: & questi sono gli cinque corpi regolari cosi chiamati per che hano le sue aree & latti vguali.



De corpi irregolari.

Corpi irregolari sono quelli, che non hano le aree, latti, & angoli vguali: come il ferratile, latterato, cylindrico, pyramidale, & vinario i quali qui apresso seguono.



ferratile.



latterato.



cylindrico



pyramidale latterato.



pyramida le misero.



vinario.

Bafe si è il fondamento d'ogni corpo.

De le misure antique.

Le misure antiquamente furono trouate da i membri del huomo, da quali hano ancora il nome. Tre sono le forti di misure la prima euthymetrica chiamata, cio è che ha solo in

se longezza, & larghezza. La terza stereometrica che ha longezza, larghezza, & crassezza.

Da la prima sorte adunque di misure si conoscono le linee. Da la seconda i piani, & superficie. Da la terza si conoscono i corpi sodi.

La prima & piu minuta di tutte le misure si è il dito, il quale si misura col trauerfo di quatro grani d'orzo, replicando poi spesse fiate esso dito, si generano poi tutte l'altre misure, si come da la multiplicazione del vnita si fa grande copia de numeri. Quatro dita poi fano il palmo, si come nel seguente ordine vedrai le loro quantita che furono da gl' antiqui vna per vna descritte.

- 4 grani d'orzo in trauerfo fano 1 dito.
- 4 dita fano 1 palmo.
- 4 palmi fano 1 pic.
- 1 pic & $\frac{1}{4}$ fano 1 cubito picciolo.
- 2 pic & $\frac{1}{4}$ fano 1 passo picciolo ò vero andante.
- 3 pic fano 1 passo grande ò sia Geometrico.
- 4 pic fa 1 vlna.
- 10 pic fano 1 pertica.
- 250 passa piccioli fano 1 stadio.
- 8 stadij fano 1 miglio Italiano.

Il mezo pic Romano secondo gli scrittori antiqui, fu di questa misura notata quiui à canto, & era partito in 6 onzie.

Due atti antiqui faceuano 1 Giugero, il quale era di longo pic 240, & largo pic 120 che faceuano in quadratura pic 528000.

Al presente vi sono in Italia di piu sorte misure secondo la varietà di luoghi, ma per hora parlaro solo del nostro di Cunco, per esser di esso meglio informato.

I nostri antiqui partirono il trabuco in parti, ò sia pic 9, & non so imaginarmi la ragione che à cio fare gli mouesse: poi che vi è il numero 10 assai piu comodo nel sommare, multiplicare, & partire le misure, si de piani come de corpi sodi, come nel successò co-

k noscer

Longezza del mezo pic antiquo di Roma.

Mezo pic di Cunco.

noscerai. Oltre che partito in pie 10 ti reca piu altre commodita, come la misura del raso da panni, che fara di due pie, & la brazza del fieno che fara 6. Similmente la tesa de la tella che è di pie 10 $\frac{1}{4}$. A le qual cose hauendo io volto l'occhio, l'ho partito in pie 10, & ogni pie in 10 onzie, & ogni onzia in 10 minuti, & ogni minuto in 10 ponti. Et la sua longhezza è qua acanto notata, di mezzo pie solo, per la breuita de la carta. Per che bisogna prima hauer cognizione de le linee, ò vero latti, che de le superficie: & anche prima de le superficie, che de la crassezza di corpi, pero prima de le misure de le linee parlaremo, poi de le superficie, & finalmente de corpi sodi: le linee adunque che si hano da misurare, si possono imaginare in tre modi. Per che ò sono stese sopra il piano come i campi, ò sagliono in alto come le torri e monti, ò dissendono al basso, come quelle che la profondita di qualche pozzo ti dimostrano.

Del planispherio Geometrico col quale si misurano le linee rette.


Auenga che vi siano piu sorte d'instrumenti Geometrici, con li quali si possa misurare la longhezza de le linee rette, nondimeno io ho eletto questo per il piu commodo di tutti, & sicuro, & tanto fara piu commodo, & sicuro quanto fara piu grande, de la cui grandezza, & composizione, hora ne parlarò à compimento.

Prima apparecchiarai vno asse di noce ben secco, ò altro legno durissimo, che sia longo, & largo almeno pie tre, ò sia vno grande passo: & con la tua squadra gli darai la forma quadrata, che habbi gl' angoli ben retti. Dopo fatto ben piano, gli darai vna coperta con colla de pittori, & vna coperta di cerusa, & sopra quella vi descriuerai tutti i numeri, linee, & spacij, che quiui apresso ti dimostrara la figura. Piu fabricarai vno indice, ò sia rigga di legno, longa pie 4 $\frac{1}{4}$ & di conueniente larghezza, sopra la quale vi fissarai due pinnacidij, ò intraguardie, con due busi nel mezo, à diametro l'vno di l'altro, & piccioli per il dritto di esso indice: come ti dimostrano le due lettere G F, poi lo fissarai con tal arte nel centro A che possi liberamente girare sopra il piano del instrumento, &

acceru

acceruarti tutti i spacij, & numeri notati sopra di esso. Bisogna ancora che sia partito tutto di longo in longo de spacij vguali à gli 600 de i latti B C D. Dopo nel angolo A vi attaccai vno piombino, che dessenda in B per veder con esso quando i piani stiano à liuello, ò non: come ti dimostra la presente figura.

Prima faccia del planispherio Geometrico longa, & larga pic 3 ò sia passo 1.



Seconda faccia ò sia inuerso del planispherio.

In questo vi descriuerai due circoli, i quali partirai al modo Astronomico in 360 parti, & ne i quattro angoli, vi noterai i quattro venti principali: bisogna ancora che vi accomodi dentro vna calamita.

Dopo fabricarai la alidada O P di legno, con due intra-
k 2
guardie

guardie al modo de le gia dette ΓG , & la fissarai con tal arte nel centro N che possi liberamente girare per tutti gli 360 gradi.

Del vso suo te ne direi vna parte nel fine del libro: per che à voler dirti tutto l'vso suo il quale è infinito non solo vscirei de i termini di Geometria, ma farei anche piu longo nel mio scriuere che non ti ho promesso. Basteti adunque per hora di saper la sua fabrica come vedi qua sotto.




L'vso de la prima faccia $ABCD$, & in qual modo si misurino le linee rette stese sopra vn piano.

CAPO I.

Si A in esempio la linea, ouer piano RS la cui longezza tu voi saper, senza partirti dal sito doue sei. Situa adunque il tuo instrumento verticalmente, & à liuello, cio è che il piombino stia nel sito, de la sua linea notata sopra il planispherio. E che il lato BC stia sopra il piano RS , & i lati AB , & CD saglino in alto. Dopo pianterai vno segno visibile nel termine S che sia alto dal piano pic 3, così alciando poi l'indice FG , infino al angolo D vedrai per le intraguardie EF se il segno

piant

piantato in s e piu alto ò basso de la tua linea visuale, per che essendo piu alto ti bisognarebbe similmente alciare l'instrumento, infino che stiano à liuello l'vno con l'altro. Dopo che hauerai bene asentato l'instrumento, meterai il tuo occhio nel angolo A & tanto alciarai, & abbasarai l'indice F o che per quegli due piccioli buchi tu veda il segno s, come vedi qua in pittura.



Per saper poi quanti passa sia la distanza R s parti 600 numero de lati del tuo strumento per 1, cio è passo de l'altezza di esso, & di nuouo parti il quoziente per il numero che taglia l'indice G F. Et saprai dal quoziente la desiaa distanza. Esempio, Parti 600, per 1, ne riessè similmente 600, il quale di nuouo parti per il numero che taglia l'indice, il quale mi imagino per hora che sia 5, haucrai di quoziente 120, & tanti passa dico che fara la distanza R s.


I termini che si ha da usare ne le distanzie grandi.

CAP. IL

PER che ne le longhe distanzie l'occhio del huomo non
puo minutamente discernere il termine come bisognareb-
ba; & che gli instrumenti manco si possono fabricare tanto
grandi, che potessero supplire al difetto del occhio nostro:
però se tu vorrai saper vna longa distanza, come per esem-
pio T V, la prima cosa ti bisogna situare, sopra qualche sca-
bello ò altro il tuo instrumento orizzontalmente, cio è che la
faccia A B C D stia piana, & volta al cielo, & la fascia H I L M,
volta à terra, con tal arte che posto l'indice sopra il primo
numero B, tu possi vedere per i buchi de le intraguardie il
termine V. Dopo senza muouer l'instrumento, girarai l'indi-
ce nel angolo D, sopra il primo numero, & al dritto de la li-
nea visuale vi planterai vno pallo; distante dal tuo sito per
k 3 passi

k 3 paſſa

passa almeno 40, nel sito x , poi mosto l'instrumento & portatolo nel sito x , lasiarai vno pallo nel primo sito τ . Di nuouo situarai il tuo instrumento orizzontalmente sopra il scabello, con tal arte che il lato AB , del planispherio vadi à fillo del pallo τ , poi girarai l'indice GF , infino à tanto, che per le intraguardie possi vedere il termine v , dopo vedi quanti numeri tagli l'indice GF , sopra l'instrumento, i quali per esemplo siano 10, multiplica adunque 600, che è lato del planispherio, per gli 40, passa che ti sei discostato dal sito τ , fa 24000, li quali parti per il numero che taglia l'indice, cioè 10, & hauerai di quoziente 2400. Et tanti passa dico che fara la distanza τv , come ti acenna la seguente figura.



*Il modo di misurare vna linea retta stesa sopra vn piano al tra-
uerso, & discosta dal tuo sito.*

CAP. III.

COME in esemplo, se fossero le due torri HR , la cui distanza vorresti saper, senza acostarti ad alcuna di esse. Prima misura al modo detto ne l'altro capo la distanza, che è dal tuo sito à la torre H , & dopo à la torre R , le quali per esemplo mi imagino che la torre H , sia distante passa 100, & la torre R , sia distante passa 150. Dopo situa il tuo instrumento orizzontalmente, con tal arte che il lato AB , vadi à diametro de la torre H , per esser piu vicina: che se fosti piu vicino à la torre R , ti bisognarebbe girare il lato AD , à la torre R , ma tornando al proposito dico che senza muouere l'instrumento girarai l'indice FG , al dritto de la torre R , il che fatto notarai nel lato AB , col sesto gli 100, spaci, & so-

pra

pra i numeri del indice notarai il numero 150, poi col tuo sesto caua la distanza de gli due ponti $M N$, de la quale facendone parangone con gli numeri partiti nel istrumento saprai quanti passa sia la distanza de le due torri, li quali per hora mi imagino che siano 120 gradi di apertura del sesto, & tanti passa dico che fara la distanza loro, per che la medema proporzione che ha il triangolo $A H R$, ha ancora il picciolo triangolo del quadrato $A M N$.


Ma per che à le fiato le distanze dal tuo sito, à le torri potrebbero esser maggiori, che non sono i numeri del istrumento. Come in esempio se la torre R , fosse passi 800, & l'altra passi 700, à l'hora ti bisogna notare nel tuo istrumento, solo le parti proporzionate à queste, come 80, sopra l'indice & li 70, nel quadrato, ma ricordati poi di acrescere vna ziphra 0, al numero de l'apertura del sesto: & hauerai il giusto numero de passi. Come ti do l'esempio, sia la torre R , distante dal tuo sito passa 800: & la torre H , passi 700: pero nota nel latto $A B$, del tuo istrumento il numero 70, & nel numero del indice 80, se l'apertura poi del sesto da l'vno numero à l'altro, fossi 40, vi acrescerai vno 0, che fa 400, & dirai che le torri sono distanti l'vna da l'altra passa 400: per che se 80, ti da 800, & 70, da 700, per la regola del tre 40, dara 400, come ne le seguenti demonstrazioni si vede.

Demonstraxione del primo esempio.



Demonst

*Demonstrazione del secondo quando i numeri
sono maggiori.*




*Il modo di misurare le linee rette, che sagliono in alto come
torri.*

CAP. IIIT.

SE la distanza dal tuo sito à la torre sarà minore de la sua altezza, come in esempio sia il tuo sito L & la torre che voi misurare M N : situa adunque sopra vno scabello ò altro il tuo instrumento verticalmente, con tal arte che l'angolo B stia nel fitto L & l'angolo C miri la cima de la torre N : dopo gira l'indice FG similmente verso de la torre, & cima N : poi vedi che numero tagli esso indice sopra il lato DC del planispherio, il quale per esempio sia il numero 6 : il che fatto che hauerai, parti il numero commune del instrumento cio è 600, per 1, cio è il passo di sua altezza, & hauerai similmente di quozziente 600, li quali di nuouo partirai per il numero che taglia l'indice, cio è 6, & il quozziente farà 100 & tanti passa dico che farà la linea hipotumifale LM come ti dimonstra il seguente disegno.

Dopo



Dopo abbassa l'istrumento, in modo che il lato AB , camini à diametro con il piano LM & senza muouer l'istrumento, alcia tanto l'indice, che per i buchi de le intraguardie FG possi vedere la punta N , poi guarda qual è il numero de l'indice, che casca sopra il lato CD , come per esempio sia 680 : dirai adunque per la regola del tre, se 680 me da 100 , quanti me dara il numero commune, cio è 600 : & hauerai di quozziente $88 \frac{2}{3}$, & tanti passa dico che fara l'altezza de la torre MN .


*Che termini si ha da usare quando la distanza de la torre
fossi maggiore di sua altezza.*

CAP. V.

QUANDO accadera che la distanza sia maggiore de l'altezza de la torre, & che l'indice FG cascara sopra il lato BC . A l'hora situa similmente il tuo istrumento al modo gia detto nel capo 4, per trouare il numero de la linea Hipothumifale, la quale mi imagino per esempio che sia passa $95 \frac{1}{2}$ & il numero de l'indice sia 650 , cio è quello che è sopra il lato BC . Dopo si come nel esempio passato togliesti per il terzo numero de la tua regola 600 , hora voglio che pigli il numero che fara dal angolo B infino al indice, il quale per esempio sia 300 : dirai adunque per la regola del tre, se 650 mi da passa $95 \frac{1}{2}$, quanti me dara 300 , & hauerai di quozziente passa $44 \frac{1}{2}$: & tanti passa dico che fara similmente l'altezza MN . Come ti dimostra la seguente pittura.

I Il mod

gino sia passa 18. Similmente misurerai la profondità $m o$, con l'istessa regola del primo capo, & facilmente hauerai l'intento tuo: come ti dimostra la seguente pittura.



Et se essa profundita del fosso p o fara per esempio passi
15 multiplica 15 per 15, fa 225: dopo multiplica la mira
di MN, che è 9 per 9, fa 81: il quale disfalcato da 225, ti
auanza 144: la cui radice quadrata fara 12. Et tanti passi
dico che fara la profundita p o del fosso. Con questa istessa
regola si puo misurare la altezza d'vno monte, stando tu in
cima.

Il modo di lucellare li aqueducti.

Innanzi che dal vſo del planiſpherio mi parſa, diroti il modo come con eſſo ſi liuellino li aquedutti, ſi per eſſere coſa pertinente à la materia de le linee che hora ſi trata, come ancora per compiacere al mio qual fratello IL SIGNOR BARTHOLOMEO PAſQVALE, gentiluomo di Cuneo non ſolò amoreuole, ma ingenioſo, & che molto di queſta materia ſi diletta. Sogliono adunque i liuelatori, quando vogliono eſercitar il ſuo officio, recare ſeco molte coſe, le quali vſiamo ancora noi: cio è due pertiche, ò canne, vna de le quali habbi in punta vno quarto di foglio di carta per il ſegno: & vno bocale per empire il liuello d'aqua quando bi-

fogna, con il calamare, & carta per notare i numeri de le distanze, & declinazioni, ò vero defendenze del terreno. Di piu recano il liuello, col quale si conosce quanto vno sito da l'altro sia piu basso. Dopo col trabuco misurano le distanze. Ma per leuati la fatica di misurare col trabuco le distanze, diroti il modo di fabricare vno liuello che fara ambidue gli effetti ad vno trato: & la sua fabrica è questa, Fa che habbi vno asse *AB* di noce seco, longo almeno pic 3, largo vno palmo, & spesso 4 dita bene lieugato, & drito, voto nel luogo *c* accio possi capire quando bisognara vno bocale d'acqua. Bisogna ancora che detto asse habbi sotto di se vno girello bucato, sopra del quale possi alciarfi, & calarsi: come ti dimostra la seguente figura *ABC*.



Dopo farai fabricare tre piccioli liuelli, de la forma qua apresso, con suoi piombi, l'vno de quali fissarai nel asse nel l'angolo *A* al trauerfo: & l'altro nel angolo *B* similmente al trauerfo del asse: il terzo poi vorrei che fossi vno poco piu grandetto de gl'altri due, cio è di vno palmo è mezzo largo: & questo fissarai nel mezzo del asse al longo. Sotto à li due liuelli de gl'angoli, vi bisogna fissare sul detto asse, due intraguardie bucate di due piccioli buchi, per mezzo de quali si possa vedere da lontano, il segno di carta che diro apresso. Di piu fabricarai vno picciolo planispherio *G*, al modo detto al principio de la Geometria, con la prima faccia solo: & che sia largo pic 1, diuiso per ogni lato in gradi 300. Et questo fissarai sotto al asse *AB* in modo che vno de suoi angoli tochi il girello di mezzo del asse: come vedi qua sotto.



Oltre

Oltre di cio fabrica il suo pic NL di legno, longo pic 6, il quale sia partito in due, da N infino ad M , in modo che il quadrante G , vi possi liberamente passare per mezo: & accioche tu lo possi con facilità situare, ouunque à te piacerà, fa à la punta L vn' altro picciolo pic, come qua.




Finalmente farai vno buco nel H doue vi planterai vno girello, in modo che possi muouersi à tuo piacere: & che habbi vna fune girata due fiato à torno, laquale va poi apesa al asse AB , come vedi qua.



L'uso del liuello.

Come gli è di propria natura de tutte le cose ponderose, di descendere sempre, & cercare il centro de la terra: così l'aque che di natura sua sono ponderose, mai possono salire in su, salvo che con qualche machina simile ad vna che faccio io, forzatamente, & contra sua natura tu le facesti salire ad alto: gli è vero che à le fiare salira, se hauera altrettanta discesa, ma non si parte pero mai dal suo liuello. Per conoscere adunque quanto vno sito sia de l'altro piu basso, & doue l'aque possino discorrere: situa il sudetto instrumento in terra, doue voi cauare l'acqua, per che meglio si liuella al in giu: Rassetato bene l'instrumento che stia fermo, volta la punta *B* al dritto de la strada doue voi che vadi l'acqua; & guarda se i piombi de li tre piccioli liuelli *D* *E* *F* cascano sopra la sua linea di mezo, alhora il liuello non pende in parte veruna. Ma per maggiore securezza empie il vacuo *C* d'acqua, & se ella stara ne i suoi termini senza spandere fuori, alhora sei certo che sta bene asentato il liuello: quando à caso pendesse dal lato *A* ò vero *B*, da di mano al girello *H* & con esso tira la fune del lato piu eleuato, & lo terminerai al suo vero liuello. Dopo bisogna che tu habbi vno compagno, al quale darai le due canne gia dette, & la misura del pic del liuello, che è pic 6, & li comanda che vada innanzi discosto circa 200 passi da te, salvo che vi fosse impedimento di monticeli, ò edificij che potessero impedire la vista del segno che porta seco il compagno: se fossero alberi si potriano tagliare. Gionto poi il compagno al luogo, li accennarai con mano, che gionti le canne insieme, & quella che ha la carta, stia piu alta de l'altra che toca il piano de la terra: & che alci, & cali il segno, infino che tu per i buchi de le due intraguardie *A* *B* lo possi vedere. Il che fatto, bisogna che il compagno distalchi da tutta quella altezza del segno di carta, la misura cio è li 6 pic de l'altezza del liuello, per che gli è di necessita saper minutamente tutte le declinazioni de i siti da l'vno à l'altro: & à la parte *P* *V* restante, comanda che vi ponga il segno di carta sopra, cio è in *P* tenendo l'*V* à terra: tu fra tanto da di mano al girello *H* che tiene le due funi, & cala tanto la parte *B* del

del liuello che per mezo de li buchi de le intraguardie *A B* tu possi vedere il segno di carta posto in *P*. Et senza muouere ponto il liuello, guarda quanti gradi tagli, ò vero nascondi il pic *N M*, liquali dato che non fosse piu di 1, parti li 300 gradi del Planispherio per 1, il quoziente fara ancora 300, & per che il liuello è alto pic 6, ò sia 2, pasci andanti: pero parti questi 300, per 2, & il quoziente fara 150, & tanti pasci andanti dico che fara la distanza *O V* cio è dal liuello al segno.



Finito cio, auicinati al compagno, & nota su la carta il numero de la distanza che è 150 pasci, & la altezza del segno *P V* quanto fara. Di nuouo situato il liuello in *V* comanda al compagno che si discosti altri 200 pasci, al drito de la strada del aqua. Et vn' altra fiata opera come di prima, notando volta per volta le distanze, & disalcando le altezze l'vna da l'altra, infino che tu gionga al termine doue voi condurre l'aqua. Finalmen

nalmente somma tutte le distanze insieme, & tutte le differenze di l'alttezze p v. Et dato che le distanze siano passi 1000, & le differenze pie 2, farano nondimeno abastanti per far discorrere l'aque: specialmente quando da qualche fiume veloce nascono.

Auertenze quando ne la strada vi fossero monticeli.


Se à caso l'aque hauero impedimento nel passare, di qualche monticello: prima suputa bene la spesa col vtile, accio non fosse piu la perdita del guadagno: & se pure vi fara vtile, alhora salì sopra il monticello tagliando via ogni impedimento di machietti, & arboseli che ti potessero dare impaccio à l'istrumento. Dopo misura l'vno è l'altro lato del monticello col planispherio grande, al modo detto nel primo capo de le linee stese sopra vno piano. Per il che diffalcando da esse due misure il minor numero dal maggiore de li due lati, saprai che differenza vi è da l'vno piano à l'altro.

Certamente farebbe stato molto bene, di hauer dato ad ogniuno di questi capi le sue dimostrazioni Geometriche: ma dubitando di esser troppo prolisso nel mio dire, ti rimetto al studio del Euclide, doue ne trouarai queste & altre infinite. Ma non parlaro de le superficie, se prima non ti hauero detto alcuni secretti di linee.

Come partirai vna linea con prestezza, in tante parti quante vorrai tu.

Descrue vno quadrato rettangolo tanto grande come à te piacerea, & nel numero che tu lo voi partire, dando à ciascheduna parte il suo numero. Dopo tira da l'vno numero à l'altro vna linea: come vedi qua in figura.

Se



Se voi dopo partire vna linea in 13 parti vguali, fa cosi: piglia col festo la longezza de la linea che voi partire: dopo riporta quella apertura del festo sopra la sudetta figura, fissando vno pic del festo in A, & l'altro sopra la linea 13, & cosi tirata la linea da l'vno ponto à l'altro, resta vgualmente partita in 13 parti.

*Il modo di ridurre due linee rette in squadra
con prestezza.*

Descruiue la linea EF, poi piantato vno pic del festo in E descriuerai le due picciole linee circolari GH. Dopo posto il pic del festo nel centro F descriuerai le altre due picciole linee circolari IL lequali taglino in croce le linee GH. Et dal i centri doue esse linee si tagliano, tira vna linea, la quale sarà giusta à squadra con la linea EF come vedi qua.

m Come



*Come la squadra si faccia nel termine
de la linea.*

Se voi che la squadra si termini con la linea, descriue la linea EF , dopo col sesto forma il triangolo equilatero MNF . Et apresso tira la linea MN , quanto puo portare la longezza del lato MN in ponto O , dal quale tira la linea perpendicolare OF , cosi dico che essa linea OF fara similmete a squadra con linea EF : come vedi in figura.



LIBRO SECONDO,

DE LE SVPERFICIE.




*Et prima de la figura triangolare rettangola
chiamata Ifofchele.*





PE R che l'Ifofchele è l'elemento di tutte l'altre figure, da queſta incominciaremo accio con piu facilità poſſi apparare l'altre che ſeguono. La figura adunque Ifofchele, come dice Euclide, ſi è quella che è formata da due lati vguali ſolo, & vno angolo retto: come

queſta.

Se adunque vorrai miſurare il triangolo rettangolo ABC moltiplica vno de lati vguali per la mita de l'altro, & hauèrai l'area ſua: come in eſempio vno de lati è 8 moltiplicato per la mita de l'altro, che farà 4, fa 3 2, & tanto farà l'area ſua.



Del iſteſſo modo ſi miſura il triangolo rettangolo ſcaleno, cio è che è formato di 3 lati inuguali, come queſto quiui apreſſo notato DEF .




Ma ſe conoſciuto che hauerai il lato FH vguale con HI & rettangolo, vorrai ſapere di quãta longezza ſia il lato GI ,
m 2 ſa coſi,

fa così, Moltiplica 6 del GH in se, fa 36, fa il simile de li 6 del lato HI farano ancora 36, somma 36 & 36 fa 72, poi caua la radice quadrata di 72 che è $8\frac{1}{2}$ & tanto fara la lunghezza del lato GI, come vedi di sopra notato: & la sua proua dal 47 del primo di Euclide si fara.


De i triangoli ofigonij.

Triangoli ofigonij sono queglii, che hano tutti gl' angoli acuti, & sono di tre sorte: Equiateri, Scaleni, & Ifoſcheli, & queſti di varie forti ſi poſſono miſurare, ma le piu facili ſono queſte.

Et prima ſe haueti da miſurare queſto triangolo ofigonio ABC, moltiplica vno de latti vguali in ſe, poi moltiplica la ſomma per 13. Dopo parti il numero che ne rieſſe per 30, & il quoziente ti dimoſtrara quanti trabuchi, ouer cubiti ſia l'area di eſſo, come in eſempio moltiplica il lato AB che è 8 in ſe fa 64, dopo moltiplica 64 per 13, fa 832, li quali partiti per 30 ti dano di quoziente $27\frac{11}{15}$, & tanto fara l'area: come vedi qua.



Si puo ancora col agiuto de la linea perpendicolare miſurare in altro modo, la qual linea ſi troua con queſt' arte: moltiplica vno de latti vguali per 13, poi parti per 15, il quoziente fara la lunghezza de la linea perpendicolare. Dopo per ſaper quanto ſia l'area, moltiplica la perpendicolare per la mitta de vno de latti vguali, & la ſomma ti dimoſtrara quanto ſia l'area: come in eſempio vedi in pittura.




Sia il ſudetto triangolo ABC per ogni lato trabuchi 5, li quali moltiplicati per 13, ſano 65, li quali parti per 15 ne rieſſe $4\frac{1}{3}$: fara adunque la perpendicolare $4\frac{1}{3}$. Se voi dopo ſaper quanto ſia l'area, moltiplica queſti $4\frac{1}{3}$ per la mitta di

di vno de latti, che fara $2 \frac{1}{2}$ & ne riefse trabuchi 10, pic 8, $\frac{1}{2}$ & tanto fara la fua area.


Del triangolo ofigonio ifofchele.

Se del ofigonio ifofchele DEF vorrai faper quanto fia la fua area; multiplica la linea perpendiculare per la mita de la bafe EF. L'efempio è quefto, Multiplica 10, che è la perpendiculare, per 6, che è la mita de la bafe, fa 60, & tanto dico che fara l'area: come vedi in pittura.




Del ofigonio scaleno.

Il triangolo ofigonio scaleno al ifteffo modo fi mifura del ifofchele gia detto: come in efempio. Sia il scaleno GHI, la perpendiculare del quale fia trabuchi 6, & la fua bafe 8: multiplica adunque 6 per 4, che è la mita di 8, fa 24, & tanti trabuchi fara l'area.



De i triangoli ambliigonij, che hano vno angolo ottufo.

Quefti auenga che di figura fiano difimili à li gia detti triangoli, nondimeno del ifteffo modo fi mifurano, cio è multiplicando le perpendiculare con la mita de le bafe: come ti dimoftra la prefente figura.



Ambliigonio scaleno.

Il modo di mifurare le figure di quatro latti. Et prima del quadrato.


Il quadrato gli è anche facile à mifurare, come in efempio.

m 3 Sia

Sia il quadrato di quatro vguali latti, & angoli $ABCD$, del quale ogni lato sia trabuchi 8, & pie 5, & onzie 5. Se vorrai saper quanto sia la sua area, multiplica vno de latti in se, come vedi quui apresso cio è trabuchi 8, pie 5, onzie 5, per altrettanti trabuchi pie & onzie cosi,

$$\begin{array}{r}
 \text{trabuchi } 8, 5, 5. \\
 \text{trabuchi } 8, 5, 5. \\
 \hline
 42 \ 7 \ 5. \\
 42 \ 7 \ 5. \\
 \hline
 68 \ 40. \\
 \hline
 \text{trabuchi } 73, 1, 0, 2, 5.
 \end{array}$$

trabuchi 8 pie 5 onzie 5.



Da la quale ne nasce trabuchi 73, pie 1, onzie 0, minuti 2, ponti 5, & tanto dico che fara l'area del quadrato $ABCD$ proposto, & per che ne la multiplicazione facilmente potresti errare, mescolando i pie con trabuchi, pero sempre che hauerai finita di multiplicare la prima ziphra, cio è il primo 5, che si multiplica, al' hora taglia i quatro primi numeri gia multiplicati: come vedi che ho fatto io. Saluo che non vi fosse che pie & onzie da multiplicare, al' hora bastarebbe tagliare due ziphre, per apartare i pie, dal onzie. Aricordati di mettere sempre i trabuchi, à fillo con trabuchi, & pie, à pie, & onzie, à onzie. Et quando l'onzie ò pie non vi fossero, meteraci vn o, in suo luogo: come vedi nel presente esempio.

trabuchi 46, pie 0 onzie 5

trabuchi 20, pie 4 onzie 0

Il modo poi di conoscere se il triangolo è rettangolo, & se la figura quadrata è di vguali angoli & latti, questo facilmente le conoscerai al occhio, con la squadra che sogliono partare i Geometri, ò sia tauolatori, quando misurano i campi.

Il modo di misurare il quadrangolo.


Auenga che il quadrangolo di retti angoli si misuri al istef-

fo modo, che si misura il quadrato, nondimeno per non dar materia di calomnia ad alcuno, l'ho voluto qua apresso annotare.

Esempio, Sia il quadrangolo rettangolo E F G H del quale F E siano trabuchi 22, pic 0, onzie 5, & F G trabuchi 136 pic 4, onzie 0, moltiplica il longo con il largo, cio è questi due numeri insieme, hauerai la capacita del area che domandi, & fa così,


$$\begin{array}{r}
 \text{trabuchi } 136, 4, 0 \\
 \underline{22, 0, 5} \\
 68200 \\
 0000 \\
 27280 \\
 \underline{27280} \\
 \text{trabuchi } 3007 \quad 6, 2, 0, 0
 \end{array}$$

Per il che ne riefse da essa trabuchi 3007, pic 6, onzie 2, & tanto fara l'area del quadrangolo: come ti dimostra la seguente figura.



Del modo di misurare il rombo.

Non replicaro piu che cosa sia rombo, poi che hauendolo gia detto nel mio principio mi parrebbe esserui troppo prolisso: bastaua adunque che vi appari il modo col quale si ha da misurare, il quale è questo. Sia il rombo I L M N di vguali latti & ogniuno di essi pic 6, & onzie 4, & la linea diagonale L N sia pic 9, & l'altra adunque diagonale I M sia pic 8, moltiplica vna di queste due diagonali per meza l'altra, hauerai l'intento tuo, cio è moltiplica 8 pic per 4 pic & onzie 5, così,




$$\begin{array}{r}
 8, 0 \\
 \underline{4, 5} \\
 400 \\
 \underline{320} \\
 \text{pic } 3600
 \end{array}$$

Ti

Ti ho dato volontiera questo esempio, accio conocesti, che quando vi sono solo pic, & onzie da multiplicare, che basta tagliare con la linea perpendicolare due ziphre, & questo è il piu facile modo di sommare le trabuazioni, o sia misure de campi de tutti gl' altri trouati per adietro.

De la misura del Romboide.

Il Romboide si misura giustamente, se prima misurarai due linee diametrali che lo parteno in due parti vguali: il che fatto multiplica la prima per la seconda. Come in esempio sia il Romboide $OPQR$, la diametrale piu longa del quale sia 20, & l'altra cio è PR sia $6\frac{1}{2}$: multiplica adunque 20 sia $6\frac{1}{2}$ fa 130, & tanto dico che sarà l'area del Romboide, & questa è la sua figura.




De le superficie irregolare dette Trapezzi, & loro misure.

Vi sono di piu forti trapezzi, non solo differenti fra loro de gl' angoli, come ancora de latti: alcuni rasomigliano al isoschele con due latti vguali, & alcuni sono rettangoli, & altri ambignonij rasomigliano: ma prima de gl' altri del trapezio isoschele parlaremo. Quando adunque il trapezio isoschele vorrai misurare, misura prima la linea perpendicolare che cadde sopra la base. Dopo misura la base & il lato opposto à quella, & giongi ambidue insiema: poi multiplica la mita di questi due per tutta la linea perpendicolare, così hauerai l'area del trapezio.


L'esem

L'esempio è questo, sia il trapezio $ABCD$, la cui perpendicolare sia 10 & la base 18, il lato poi oposto 6 : giongi insieme 18 & 6, fano 24, i quali partiti in due parti ne riefse 12 per parte. Moltiplica adunque 12 per 10 de la perpendicolare, & hauerai 120 area del trapezio, & la sua figura è questa.




Gli è ancora il trapezio rettangolo facile da misurare, se giongerai insieme i due latti paralleli, & piglierai la mita del numero, col quale moltiplicarai l'altro lato, che forma gli angoli retti, con le parallele, & quello che ne riefse ti dimostrerà l'area del trapezio.

Ma per piu chiarezza ti do l'esempio : sia il trapezio rettangolo $EFGH$, la base del quale, cio è FG sia 45, & la sua parallela cio è EH , sia 15, gionte insieme, fa 60, la cui mita è 30. Moltiplica adunque 30 con il lato EF che è 30 fa 900, & tanto fara l'area del trapezio rettangolo : come ti dimostra la seguente figura.



Se à caso ti occorresse misurare vno trapezio ambilgionio, à l'hora parti il trapezio in due triangoli, dopo per le regole gia date de triangoli gli potrai suputare, & la sua figura, & partimento viene quiui apresso.



De le figure poligonie, & loro misure.

Le figure poligonie, ò sia multilateri le quale sono da più di quatro angoli formate.


Alcune di loro sono regolari, & alcune irregolari. Le regolari sono quelle che hano i latti, & angoli vguali, & le irregolari hano gl' angoli & latti inuguali.

Quando adunque vorrai misurare il poligonio regolare, vſa questa regola generale: Trouato il centro de la figura descriue vna linea perpendicolare dal centro nel mezo di qual si voglia lato: dopo moltiplica la mita de la circonferenza per la linea perpendicolare & la somma fara l'area sua.

Et sia in esempio il pentagono *A B C*, i latti del quale siano trabuchi 12, per ogniuno di loro, & la linea perpendicolare *D E* trabuchi 8. Per che adunque 5 sia 12, fa 60, la mita de la circonferenza fara trabuchi 30. Pero moltiplica 30 per 8 che è la perpendicolare, ne riefſe trabuchi 240, & tanto fara l'area del pentagono qua sotto signato.




Al istesso modo si misura il sottoscritto Esagono regolare *D E F*.



$$\begin{array}{r} 36 \\ 10 \\ \hline 360 \end{array}$$

Quando


Quando la figura poligona folsi irregolare, à l' hora ti bisogna partirla, in manco numero de triangoli che fia pofsibile. Dopo gli fupputarai al modo gia detto de triangoli. Et per efempio ti propongo la fequente figura *G H I L M*.



De la figura circolare & fue mifure.

La figura circolare è la piu perfetta di tutte l'altre figure, & fimilmente la piu difficile da tirare fotto la mifura, nondimeno Archimede Philofopho vole, che vi fia la ifteffa proporzione da la circonferenza al diametro del circolo, che è da 7 à 22, cio è che effendo il diametro trabuchi 7, che la circonferenza fara 22 : cofi tre diametri & $\frac{1}{7}$ fono vguali à la circonferenza. Pero in tal modo fi potra mifurare l'area del circolo, multiplica la mita de la circonferenza per la mita del diametro, & hauerai la fua area.

Similmente partendo la circonferenza in quatro parti vguali, hauerai l'area de gl' angoli del quadrato che rinchiude il circolo. L'efempio è quefto, Sia il quadrato *A B C D*, col circolo rinchiufo dentro che tochi il latti del quadrato, & il diametro di effo circolo fia trabuchi 14, la circonferenza fara 44 : per il che multiplicando la mita de l'vno per la mita de l'altro, cio è 22 per 7, fa 154, & tanto fara l'area del circolo. Dopo partendo la circonferenza cio è 44 per 4, ne rieffe 11, & tanto fara l'area de gl' angoli del quadro per ogniuno di loro : come vedi qua in figura.



n 2

Efemp

Esempio secondo.


Si potrebbe ancora in altro modo saper l'area del circolo, moltiplicando il diametro in se, di nuouo poi moltiplicare quella somma per 11, & partir per 14, ne rieße l'area: come in esempio sia il diametro 10 moltiplicato in se, fa 100: di nuouo moltiplicando questi 100, per 11, fa 1100, il che partito per 14, ne rieße 78, & $\frac{4}{7}$ & tanto fara l'area del circolo.

Come dal numero del area si possi saper il diametro.


Pigliando il sudetto esempio, cio è che l'area sia 78, & $\frac{4}{7}$ moltiplica questo numero per 14, fa 1100, il che parti per 11, il quoziente fara 100, dal quale caua la sua radice quadrata, ne tieffe 10, & tanto fara il diametro.

Del mezo circolo, & sue misure.

Moltiplicando similmente la mita de la circonferenza, per la mita del diametro, ne rieße l'area del mezo circolo: l'esempio fara anche simile à quello del circolo già detto. Sia il semicircolo EF, il cui diametro sia 14, & la circonferenza 22: moltiplica la mita del diametro, che è 7 per 11, mita de la circonferenza, & ne rieße 77, & tanto fara l'area sua.




Con la istessa regola tu potrai ancora misurare tutte le parti del circolo: come in esempio, Sia la parte circolare GHI, il cui semidiametro sia 7, & sua circonferenza 14: moltiplica adunque 7 per 7, che è la mita de la circonferenza, ne rieße 49. Et tanto fara l'area sua, come ti dimostra la seguente figura.



Se à caso hauesti da misurare la parte GIM, suputa prima la parte del triangolo isoscele, secondo la regola sua già detta per adietro, poi sottra questa somma da tutta l'area de la parte intiera, & hauerai l'area de la parte GIM che desiderii. Sia in esempio la parte GHIM la quale sia partita da la corda

Corda G I: moltiplica adunque prima il triangolo ifoscele, che sia per hora trabuchi 22, disalcando questi da 49, che è tutta la somma del area, ti auanza 27 trabuchi, & tanto dico che sarà la parte GIM come vedi al occhio.




Queste sono le cose de le superficie piane, & loro misure che mi sono parse piu necessarie al nostro continuo vso, se qualche studioso ingegno non si contentara di queste, & vogli saper le misure de tutte l'altre superficie ottogone, decagone, & duodecagone, veda l'Algebra del Signor Cardano, & l'Euclide, che iui trouara da saziare l'animo suo. Ma prima che de i corpi sodi parliamo, ho pensato che sarà cosa non poco vtile à molti artefici dechiararli alcuni belli compartimenti, & modi di duplicare, & trasformare le superficie in varie figure. Et prima de le superficie triangolari parlaremo.

Il modo di descriuere atorno à vno circolo, vno triangolo equilatero. Regola I.

Forma prima il circolo, atorno al quale voi descriuere il triangolo: poi parti esso circolo in tre parti vguali, il che farai facilmente con la istessa apertura di sesto, notando vno ponto di due in due spacij del sesto mentre lo vai girando atorno à la circonferenza. Dopo dal centro D descriuerai le tre linee D C & D A & D B che caschino sopra i ponti già notati ne la circonferenza del circolo, & fa che eschino tanto fuori del circolo, quanto è similmente il spacio dal centro


D à la circonferenza: finalmente da gli termini di esse linee descriuerai le linee E F & F G & G E, lequale ti formano il triangolo giusto, come vedi qua sotto.



Il modo di formare vno triangolo vguale al quadrato.

Regola 2.


Quando d'vna superficie quadra ne vorrai formare vna triangolare vguale à quella, fa così come in esemplo. Sia il quadrato $L M N O$: partirai adunque il lato $L M$ in due parti vguali in P : così tre di quelle aperture di fesso, ti darano la longhezza d'vno de latti del triangolo equilatero.



Il modo di fare d'vno triangolo, vno quadrato vguale à quello. Regola 3.

Sia di qual si voglia sorte triangolo che tu ne vogli farni vno quadrato: come in esemplo sia il triangolo $Q R S$: descrive prima la linea perpendicolare $R T$, dopo parti la linea $R S$ in parti due vguali in V : il che fatto che hauerai descritto la linea $x z$ equidistante da la linea $Q S$, & fa che passi per il centro V , & il quadrangolo $Q S x z$ così farà vguale al triangolo $Q R S$.

Se lo vorrai poi fare quadrato, vfa la regola seguente.




Il modo di fare d'vno quadrangolo, vno quadrato equilatero vguale à quello. Regola 4.

Sia in esemplo l'istesso quadrangolo sudetto $Q S x z$, il qua-

lc

le voi fare quadrato, fa così, Piglia col tuo sesto il spacio xQ , & la longezza Qs , & di questi due latti ne farai vno che sia vguale à quelli due: come vedi ne la seguente figura, per lettere ABC . Dopo partirai il spacio AC in due parti vguali, in D , & da esso centro descriuerai il mezo circolo AEC , poi dal centro B tira la linea perpendicolare BF , che tochi la circonferenza del mezo circolo, & essa sarà vno de latti del quadrato che ricerchi.



Come d'vno picciol quadro se ne formi vn' altro al doppio di quello. *Regola 5.*

Sia in esempio il picciolo quadrato LMQ : se vorrai dopo formare vno quadrato doppio à quello, fa così, Descrive vna linea dal angolo P che vadi al angolo Q , & essa ti dara la longezza di vno de latti del quadrato grande. Et questa regola ti serue similmente ne i triangoli isoscheli.


Triangolo isoscele.



Triangolo isoscele.


Il modo di triplicare vno quadrato. Regola 6.

Sia in etempio il quadrato $ABCD$ il quale voi triplicare, cio è farni vno che sia tre volta piu, fa cosi. Piglia col sesto la longezza del lato AB & con quella apertura di sesto descriue vno circolo, il quale partirai in tre parti vguale in ponto EFG . Et da l'vno ponto à l'altro vi tirerai vna linea, cio è la linea EF & FG & GE come ti dimostra la seguente figura, & dico che la linea EF ti dimostrara vno de latti del quadrato triplicato.



Il modo di farlo che capisca sette volta il picciolo quadrato. Regola 7.


Se vorrai che il tuo quadrato grande capisca sette fiato il picciolo, fa cosi. Descruiue il picciolo quadrato $ABCD$ & distendi la linea BC otto volta tanto quanto è il spacio BC infino al ponto E : dopo parti la linea BE per mezo in F dal qual centro descriuerai vno mezo circolo, che vadi sopra i termini de la linea BE : il che fatto che hauerai, distendi similmente il lato CD del picciolo quadrato infino à la circonferenza del mezo circolo in ponto G , & essa linea ti dimostrara il lato del quadrato grande.



Come di vno hefagono si poſſi fare vno quadrato vguale
a quello. *Regola 8.*

Sia in eſempio l'hefagono $H I L M N O$, da gli cui angoli deſcriuerai le tre linee, cio è $H M$, & la linea $O L$, & $N I$, dopo ti-
ra à parte vna linea $P Q$, che ſia longo vno diametro e mezzo
del hefagono. Et ſopra di eſſa vi deſcriuerai tre triangoli vguale
à quelli del hefagono. Et ſopra le ponte de i detti triangoli vi
tirarai la linea parallela $R S$, la quale chiudendola con la linea
 $P Q$, ti dara vno quadrangolo vguale al hefagono.


Se lo vorrai dopo fare quadrato ſia la regola 4, già detta
di ſopra.



Il modo di trovare il centro d'vno hefagono in vna linea.

Come vno pentagono ſi poſſi quadrare.

Se hauerai bene intesa la ſudetta regola del hefagono, in
queſta non hauerai difficoltà alcuna, pero, con la ſola ſigu-
ra l'intenderai.




Il modo di fare vno circolo vguale al quadrato.

Regola 9.

Sia in eſempio il quadro rettangolo $A B C D$: parti adun-
que la linea diagonale $A C$ in dieci parti vguale. Dopopianta
il pic

il pic. del fesso nel ponto di mezzo signato E. Et aprirai tanto il fesso che abbrazzi quattro di esse parti. Et con quella apertura descriuerai il circolo, il quale dico che sarà uguale al quadrato.



Il modo di trouare il centro d'una parte del circolo.

Regola 10.


Per trouare il centro di qual si voglia parte del circolo: come in esempio de la parte circolare FGH tira la linea diametrale FH, sopra la quale, & nel cui mezzo descriuerai l'altra linea perpendicolare. & à squadra GL: dopo col fesso caminando su, & giù di essa cercarai il centro M.



Il modo di trouare il centro d'una superficie circolare.

Regola 11.

Sia in esempio la superficie circolare NOP, ne la quale descriuerai la linea NP à tuo piacere, per che tagli vna parte di essa superficie circolare. Dopo secondo la regola 10 de linee noterai le due linee in croce QR. Et partita similmente la linea NP in due vguale parti in S tirarai la linea OS, che passi per la croce QR. Et caminando per essa linea perpendicolare, facilmente trouarai il centro V.




prob. 201

il mod


*Il modo di descrivere vn circulo, attorno a quel si voglia
un triangulo. Regola 12.*

Sia in esempio il triangolo ABC attorno del quale vorrai descrivere il circulo, fa così, Pianta il pie del sesto prima in A , Et descriuerai la linea circolare DE : similmente muta il pie del sesto in ponto B . Et con l'altro descriuerai la linea circolare FG . Finalmente portato il pie del sesto in ponto C descriuerai la linea circolare LM , che chiude l'altre due. Dopo tira la linea DE che passi per il mezo de le due linee circolari, similmente tira la linea FG , che passi per il mezo de le due linee circolari, & doue si tagliano queste due linee, quiui sarà il centro del circulo: trouato il centro, apri il sesto, tanto che dal centro N , arriuai à l'vno de i tre angoli del triangulo. Et con quella apertura descriuerai il circulo.





*Il modo di descrivere dentro e fuori del circulo vno
quadrato. Regola 13.*

Sia in esempio il circulo $O P Q R$, nel quale descriuerai il diametro $P R$ che passi per il centro. Dopo per la seconda regola già detta, descriuerai la seconda linea $O Q$, che tagli la linea $P R$ in due parti uguali, con gli angoli retti, & queste due linee ti dimostrano gli angoli del quadrato.



Il modo di partire vna circola in otto parti & formare la superficie ottagonale. Regola 14.

Partito che hauerai la tua circonferenza in quattro parti vguali, partedo di nuouo vna de le quattro parti in due vguali, come vedi ne la seguente figura: hauerai il modo di formare il tuo ottagonò: partendo poi vno de' lati del ottagonò in due parte vguali, hauerai finalmente partito il circolo in sedeci parti vguali.



Il modo di partire il circolo in tre, sei, noue, & dodeci parti.


Regola 15.

Per partire il circolo in sei parti, non ti accade vsare gran arte, per che caminando con la istessa apertura del sesto attorno à la circonferenza, in sei passi fara partito: per questo chiamano sesto il compasso, per che da se stesso ti da la sesta parte de la circonferenza che formo.

La istessa apertura partita poi in due, ti forma la superficie duodecagona, cio è parte la circonferenza in dodeci parti vguali.

Se vorrai partire la circonferenza in tre, con la istessa apertura ancora si fara, se di due in due passi del sesto noterai vno ponto.

Dopo che il circolo fara partito in tre parti vguali, se di vna di esse ne farai tre parti, facilmente si partira il circolo in noue parti, come vedi qua.






Il modo di formare l'heptagono. Regola 16.

Formato che hauèrai il tuo triangolo al modo sudetto, facilmente partirai il circolo in sette parti vguali. Come in esem pio sia il circolo ABC nel cui mezzo sia descritto il triangolo: parti adunque vno de latti in due parti, cio è la linea BC : poi dal centro D tira la linea DE , dopo piantato il pic del sesto nel angolo C descriuerai la linea circolare FG . Et dico che il spacio GC sarà la settima parte de la circonferenza.

Partendo poi vna di queste parti in due, restara il circolo partito in quatuordecì parti vguali: come vedi qua.




Il modo di formare la superficie pentagona.

Regola 17.

Si forma il pentagono, descriuendo prima il circolo CE dopo piantato il pic del sesto sopra la circonferenza di esso circolo, similmente descriuerai la linea circolare DEN , che passi per il centro C : dopo con la linea IL partirai l'vno circolo da l'altro, & dal centro L descriuerai il mezzo circolo

MON: poi dali centri CH tira vna linea trasuersale: cio fatto tira le due linee MD & NC le quali passino per il centro O . Dopo descricue le linee GC & DN & GP & DP , cosi tirata formata il pentagono. $\square$



Il modo di descrinere vno circolo atorno al pentagono.

Regola 18.

Sia in esemplo il pentagono sudetto $PCHDP$ tira adunque vna linea dal angolo P che passi per mezo di GH & similmente la linea dal angolo C che passi per mezo DH & doue esse due linee si tagliano in R quiui fara il centro del tuo circolo: come ti rapresenta questa pittura.



prob. 34.38

Il modo di partire il circolo in dieci, & quindecim parti.


Regola 19.

Sara cosa facile partire il circolo in dieci, se partirai vno de latti del pentagono in due. Et se lo partirai in tre, restara la circonferenza partita in quindecim latti.

In che modo se habbino da gouernare, quegli che misurano i seni su le volte. *Regola 20.*

Quando i seni si hano da misurare su le volte di muro, al hora

all'horai bisogna la prima cosa veder, quanta scesa fu data à la volta, cio è qual parte de la larghezza del edificio fu data à l'altezza de la volta, & quando vi troui il quarto d'altezza, come è l'ordinario, rettenerai ancora tu $\frac{1}{4}$ di detta altezza: come ti dimostra la seguente figura: per il che dico che, pigliando di 4 pie d'altezza vno, che tanto, farà la parte s, quanto la parte t per la regola nona antedetta del circolo al quadrato:



Il modo di formare la figura onale. Regola 21.


Prima descriue il diametro AB de la tua figura, di quella larghezza che à te piacerà, dopo lo partirai in quattro parti vguai in C D E poi pianta il pie del festo in C & col altro descriuerai la linea circolare FG : similmente piantato il pie del festo in E con la istessa apertura descriuerai la linea circolare LM . Dopo tirata vna linea per il centro D & à squadra de la linea AB notarai sopra di essa dal centro D la mita del spacio DE cio è DN & DO : poi dal centro O descriuerai la linea circolare PQ : similmente piantato il pie del festo in N con l'altro descriuerai la linea circolare Q : così ti restara formata detta figura come vedi qua in pittura.



Il modo di partire vno circolo secondo l'uso astronomico.

Regola 22.

Prima partirai il circolo in quattro parti vguali; dopo partirai vna di esse in tre, & restara partito per 30: se partirai poi il 30, per tre, fara partita la circonferenza di diece, in diece. Di nuouo parti le decime per mitta, & hauerai tutti i cinque: finalmente parti i cinque per cinque, & restara il circolo partito in 360, parti vguali: come qua.



LIBRO TERZO, DI GEOMETRIA.



Cio è de le misure di corpi sodi.



E corpi sodi alcuni sono rettangoli, come il cubo, il quale è formato da sei superficie quadrate, come il dado: & al istesso modo del cubo si misurano piu altre cose, come i feni, muraglie, & altre simili. Volendo adunque misurare il corpo cubo, multiplica il longo, con il largo: & di nuouo multiplica questa somma col numero di sua altezza, & hauerai la capacita del cubo. Sia in esempio il cubo $ABC D$, del quale ogni lato sia 6, se multiplicarai adunque il lato AB per il lato BC fara 36. Di nuouo multiplica 36 per gli 6 de l'altezza BD , ne riesce 216: & tanti pie fara la capacita del cubo: come ti dimostra la figura che seguita.



Mi pare che fara cosa vtile, replicare ancora le misure del cubo, per insegnarti vno modo breuissimo di suputare vno numero grande: & saper quanti trabuchi, pie, & onzie faccia in vn tratto. Se à caso il numero che riesce da la multiplicazione fossi 2560 taglia tutte le migliaia con vna linea, & similmente le centinaia, & decene, come queste 2 / 5 / 60: cosi subito potrai dire se la tua pertica, ò trabuco è diuiso pero in 10 parte, che quel numero fa trabuchi 2, pie grandi 5, & onzie grande 60, il che non potresti fare se il trabuco fosse partito in 9 parti: per che al hora bisognarebbe partire 2560 per 729, il che è fastidioso, & longo: pero ne la prima parte ben ti ho detto che era meglio partire la pertica, ò sia trabuco in 10 pie. Et cosi la nostra brazza del fieno sarebbe pic 6, che anche assai piu facile nel suputare, ò vero

p. partire

partire quella istessa longezza de la brazza in parti 10, & fara piu facile ancora.

De le misure di colonne tonde & triangolare.

De le colonne quadre, & loro misure non dico altro, dandomi à credere che facilmente dal esempio del cubo gia detto le cauerei: le colonne adunque sono corpi longi di vna vguale grossezza, da per tutto, & di vguali bafe. Quando adunque tu vorrai saper la quantita di qual si vogli colonna regolare, multiplica la circonferenza de la bafe nell'altezza di essa colonna, & hauerai la superficie de la longezza de la colonna, à la quale se vi agiongerai l'arca di ambedue le bafi, saprai la superficie di tutta la colonna. Quando volesti poi saper la sua crassezza multiplica l'arca de la bafe, ne l'altezza de la colonna, & fara fatto l'intento tuo: come in esempio, Sia la colonna A B C, le cui bafe, o fазze siano circolari, & vguali. suputa adunque prima l'arce de le bafe, secondo la regola data de le figure circolare, le quali per hora presupongo sia brazza 30 per ogniuna, & sua circonferenza 20 brazza, & l'altezza de la colonna 10 brazza: multiplica adunque 20 per 10 fa 200. à le quale agiongeui l'arce de le bafi, cio è 30, & 30 fara 260, & tante brazza quadrate fara la sua superficie: & se multiplicarai 30 per le istesse 10 brazza hauerai la crassezza di tutta la colonna, cio è di brazza 560 fode,

Al istesso modo potrai misurare le colonne triangolare: come le seguenti figure ti dimostrano.



Il modo di misurare le piramide.

Tutte le piramide regolari si misurano à vno istesso modo. Se adunque multiplicarai l'area di qual si voglia piramide regolare, ne la terza parte di sua altezza, saprai la crassezza di essa piramide: per che adunque bisogna saper l'altezza sua, fa così, Multiplica la linea hypothumifale de l'altezza in se, dopo multiplica mezo il diametro del circolo de la base in se, & disfalca quello che ne essie da la prima multiplicazione: poi cauaua la radice quadra del restante, & quella sarà la vera altezza de la piramide.

Sia in esempio la piramide ABC . Et la linea hypothumifale AB sia pic 10, multiplica 10 in se fa 100: sia dopo il mezo diametro BC de la base pic 5, per che adunque bisogna trouare la linea AC , multiplica ancora 5 in se fa 25, disfalca 25 da 100 auanza 75, la cui radice quadrata sarà pic $8\frac{1}{2}$ & tanti pic sarà la linea perpendiculare AC . Et sia l'area de la base per hora 90, multiplica adunque 90 per 8 & $\frac{1}{2}$ ne rieße 780, la terza parte del quale sarà 260, & tanti pic cubi sarà la crassezza de la piramide tonda ABC .



Esempio de la piramide quadrata.


Sia di nuouo la piramide quadrata DEF , de la quale ogni lato de la base sia 6, & l'area sarà 36 per la regola data de la figura quadrata: & la linea perpendiculare DF , cio è l'altezza de la piramide sarà $9\frac{1}{2}$: per che se multiplicarai $4\frac{1}{2}$ in se fa 18, & di nuouo multiplicarai la linea hypothumifale, che è 10 in se fa 100, da quali disalcandone 18 auanza 82, la radice quadrata del quale sarà $9\frac{1}{2}$: multiplica adunque li 36 de l'area per $9\frac{1}{2}$ ne rieße 328. Et la sua terza parte sarà 109 & $\frac{1}{2}$ & tanti pic cubi diro, che sarà la crassezza de la piramide che seguita.



Del corpo spherico, & sue misure.

Di due sorte si puo misurare vno corpo spherico, ò che si misura la superficie, ò vero la crassezza. Ma parlian prima de la superficie, la quale cosi potrai sapere. Moltiplica il diametro de la sphaera, per la circonferenza del suo circolo piu grande, & hauerai la superficie di essa sphaera. Sia in esempio il seguente corpo spherico *A B C* il diametro del quale sia pie 14, per la regola gia detta di sopra la circonferenza sara pie 44 & la sua area 154. Moltiplica adunque 44, per 14, ne rieße 616, & tanti pie quadrati dico che sara la sua superficie sola.


Quando poi volesti misurare la sua crassezza, moltiplica la superficie, in la sesta parte del diametro, & ha uerai l'intento tuo. Cio è moltiplica li 616, per $2\frac{1}{3}$ ne rießera 1437 $\frac{1}{3}$: cosi hauerai la crassezza di tutto il corpo spherico *A B C*.



Con questa istessa regola si puo facilmente saper la superficie, ò sia crassezza de la meza sphaera.

Il modo di duplicare, ò triplicare vno corpo spherico, come balle d'artellaria.

Prima descriuerai la linea *A B* de la longezza che à te piacerà, dopo sopra di essa descriue la linea perpendicolare, & à squadra *C D*: cio fatto nota dal centro *E* verso *D*, il diametro del corpo spherico che tu voi duplicare: poi con la medema apertura camina dal centro *E* verso il *B* due fiate, & se volesti triplicare ti bisognarebbe camminare con tre, ma per hora bastara di due come vedi ne i ponti *F G*: poi parti in parti vguale *E F* in ponto *H*: di nuouo parti i due vguale parti *E H* in ponto *L*: similmente parti per mezo *L H* in ponto *M*. Dopo piantato vno pie del sesto nel centro *M* & l'altro in *G* descriuerai il mezo circolo *N C G*: cio fatto partirai la linea perpendicolare *C D* per mezo in *O*, & da esso centro descriuerai la linea circolare *N R C*: per il che dico, che il spacio *N E* fara doppio al spacio *E D* secondo la nona del sesto di Euclide come ne la seguente figura poi vedere.




*Con qual arte si formino le picciole balle di corame
per il giuoco.*

Sia in esempio la circonferenza $PQRS$ la quale partirai in 24 parti vguali. Dopo piantato il pic del festo nel centro s , descriuerai la linea circolare TV che abraccij parti sette de la circonferenza, & poi il simile farai piantando il pic del festo in $\& Q$, con l'altro descriuerai la linea circolare xz con la istessa apertura di festo: per il che dico, che tagliando due simili pezzi di corame, che facilmente formarai le tue balle come ti dimostra la seguente figura Z.



Il modo di fare la stampa de baloni grandi.

Forma prima il triangolo ABC grande à tua fantasia, poi parti la linea AB in tre parti uguali, & tirata la linea CG che passi per il centro F la farai uscir tanto fuori de l'angolo del triangolo, quanto è vna de le tre parti de la linea AB che arriui al ponto H . Dopo metendo vno pic del festo in ponto H & l'altro in A descriverai la circolare linea IK . Et il simile farai da gl' altri latti: & hauesti l'ottaua parte del ballone.



De le botte da vino, & loro misure antique, e nuoue.

Hebbero gl' antiqui diuerse sorte di misure, de le quale dottamente ne parlano il Signor Alciato, & il Signor Budeo huomini de la nostra eta dottissimi, & auenga che fra loro ancora bene non concordino, nondimeno sono da laudare ambidue, poi che con loro fatiche ne hano almeno fatti heredi

redi di questo poco che segue, l'openione del Signor Alciato è questa.

Gl'antiqui chiamarono Asse non solo il peso, ma ancora ogni cosa intiera, come vna heredita, la quale partuiano in duodéci onzie, si come faceuano anche la libra, & ad ogni parte dauano il suo particular nome, come seguita.

Asse ò sia libra etia di onzie 12

Deunx onzie 11

Destante onzie 10

Dodrahte onzie 9

Bessie onzie 8

Septonte onzie 7

Mina ò corila onzie 6

Quinconze onzie 5

Triente onzie 4

Quadrante onzie 3

Sestante onzie 2

Onzia onzie 1

Hora sapi che ne i pesi Asse era il principio, ne le misure Geometriche il pie, ne le cose humide come vino, & seche come grano, fu il staro, il quale era di 15 onzie, si ne le cose seche, come humide, le quale misure volendole esaminar per onzie nostre & liucre crubi stano cosi, onzie 1 faceuano vno Cyathos

3 ciati vno quartaro ò vero onzie 3

2 quartari vna mina ò vero onzie 7

2 mine vno staro ò vero onzie 11

3 stara il chenise ò vero onzie 9

6 stara faceuano il congior ò vero onzie 6

6 stara il modio ò vero onzie 20

24 stara vna vna ò vero rubi 1

48 stara vna amphora ò vero rubi 2

60 stara faceuano il cado ò vero rubi 75

99 stara faceuano il medinno latino à rubi 118

120 stara vna Hydria rubi 9

960 stara faceuano il culco.

3525 stara vno coro faceuano: Ma de le misure antique ne

si


si

sia detto assai per hora, parliamo di quelle di nostri tempi, & del luogo di Cuneo.

Fra tutte le misure di Cuneo, sol questa mi è parsa che fossi fondata sopra qualche ragione. Et prima partirono il staro, il quale è di rubi 10, in due mine, & ogni mina, in due quartari, ò sia brochi, & ogni quartaro in 18 pinte, & ogni pinta, in due bocali, in modo che il staro viene à esser di pinte 72, il qual numero è molto comodo in cio, per hauer in se assai parte aliquote, & per tanto si puo partire in diuersi modi, come per mita per terzo, quarto, sesto, ottauo, nono.

Se alcuno vorra adunque saper quanti stara, & pinte capisca ogni botte da vino, ò altro vase picciolo, ò grande che sia, pur che non pasci stara diece, bisogna che prima fabbrichi vna bachetta quadrata di legno, longa almeno palmi sette, & in vno de' latti vi notarai con segni di lotone, ò altro questi spacij vguagli che seguono: tanto come sarà la longezza di tutta la bachetta, & sapi che ogniuno di questi significa vno quartaro, ò sia broco.

Et questa è la longezza de' spacij vguagli.



Et questi spacij gli lascio in tua libbertà di poterli scurtare, ò alongare poco poco, secondo che vedrai che le tue misure riescono più, ò meno abondanti: & secondo la diuersità de' paesi, & stari.


Da l'altro lato de la bachetta vi notarai con lottone similmente tutti spacij inuguali, al modo che hora qua apresso ti disignaro in piu pezzi, poi che la breuità de la carta non puo capire tanta longezza. Et nota che questi spacij non si possono scurtare, ne alongare, come gli spacij vguagli notati da l'altro lato. Ti auiso ancora che ogni pezzo di questi qua apresso notato, significa vno staro, saluo il primo, il quale per esser piu longo l'ho partito in tre pezzi. I segni poi di questa figura o — significano i quartari, & i ponti le pinte, saluo i ponti de gli sette vltimi pezzi, ò sia stari, i quali sono dopij, cio è che ogniuno di loro vale due pinte.

Questa è la giusta, & vera misura de la nuona inuentione de la Bachetta.






6° stato



5° stato



4° stato



3° stato

Nota che ognuno de li ponti che sene vale due.

si fanno i ponti di due



8°. Stato

9°. Stato

10. Stato

11°. Stato

Oltre à la bachetta di legno, ti bisogna ancora hauere vna verga di ferro, ronda, & sottile, longa similmente palmi 7, per caciare ne la botte, & riportar le misure à la bachetta di legno: come ti insegnarò apresso. Ti bisogna ancora vno sestio, per le misure di scemi.

Apparechiati che hauerai tutti questi instrumendi, misura prima l'altrezza de la botte dal cuchione, & il diametro del fondo: poi somma tutto insieme, & parti vguualmente in due parti per saper la vera altrezza. Dopo fatone di quella parte pinte, moltiplicate col numero delle pinte de la longezza de la botte: poi parti la somma due fiato per 725 & la prima fiata hauerai di quoziente quante pinte capisca la botte, & la seconda fiata i stara, come in esempio sia la botte A B, la quale sia alta di cuchione stara 4, & pinte 14, & il fondo di essa sia di diametro stara 34 & pinte 21, li qual numeri sommati insieme fanno stara 7 pinte 35, ò vero pinte 539, per

q 2 che

che ti ho già detto, che pinte 72 facciano vno staro. Hora parti il numero 539 in due parti vuali, hauerai di quozzi-
 ente pinte $269 \frac{1}{2}$. Di nuouo con la verga di ferro misurarai
 per il buco adonde piglia fiato la botte, quanto essa sia longa
 dentro (per che non voglio che misuri il legno ma solo il va-
 cuo de la botte) & riportarai quella longezza à la bachetta
 di legno dal lato de spacij vuali, la quale ti dimostrerà il nu-
 mero de stara che capisce tal longezza. Et fingiamo sia per
 hora stara 2 pinte 18, ò vero pinte 162, come vedi qua.



Dopo multiplica le $269 \frac{1}{2}$ pinte per le 162 & ne uscirà
 43659, il quale partito per 72 farà di quozzi-
 ente pinte $606 \frac{1}{2}$: se vorrai saper quanti stara siano, parti di nuouo le
 $606 \frac{1}{2}$ pinte per 72. Et hauerai di quozzi-
 ente stara 8, & pinte $30 \frac{1}{2}$ & tanti stara e pinte dico che capisce la botte.

Il modo di misurare il scemo.

Se à caso vi mancasse del vino ne la botte il terzo, ò quar-
 to, qual si voglia, ancor che non siano che 4 pinte facilmen-
 te il saprai, se partirai l'altezza del cuchione in quattro parti
 vuali col sesto, & di vna di esse ne farai 15, & con l'istessa
 apertura del sesto, misurarai quella parte che sarà minore;
 cio è ò il vacuo de la botte, ò il vino, sapendo il numero di
 quante aperture di sesto sia quella minor parte, vedi ne la se-
 guente tauola quello numero istesso, che numero ha al in-
 contro, & con esso multiplica il numero de le pinte che ca-
 pisce tutta la botte: poi parti per il partitore de la tauola, che
 è 2828, & il quozzi-
 ente ti dimostrerà quante pinte ca-
 pisca quella minor parte: come in esempio,

La botte capisca come già ti ho detto pinte 606 $\frac{1}{4}$, & l'altezza del cūchione sia stara 4, & pinte 14, cio è dal lato de la bachetta due sono i spacij inuguali: pero col sesto partirai quella longezza in 4 parti vguali, & di vna di esse ne farai 15, & con quella istessa apertura di sesto, misurerai la minor parte, come ti ho detto, la quale per esempio sia il vacuo de la botte che fosse 16 aperture di sesto, vedi ne la seguente tauola, doue è il numero 16. Et trouarai al suo incontro il numero 605, col quale multiplica il numero de le pinte che capisce tutta la botte, cio è 606 $\frac{1}{4}$ & sarà 366630, il quale parti per 2828 $\frac{1}{2}$ & hauerai di quoziente pinte 128 poco piu. Et tante pinte di vino dico che mancano ne la botte.

Questa è la tauola col partitore.

1	10	$\frac{1}{4}$	16	605	0
2	28	$\frac{1}{4}$	17	659	$\frac{1}{4}$
3	52	$\frac{1}{4}$	18	714	$\frac{1}{4}$
4	80	$\frac{1}{4}$	19	769	$\frac{1}{4}$
5	112	$\frac{1}{4}$	20	825	$\frac{1}{4}$
6	147	$\frac{1}{4}$	21	882	$\frac{1}{4}$
7	184	$\frac{1}{4}$	22	939	$\frac{1}{4}$
8	224	$\frac{1}{4}$	23	998	$\frac{1}{4}$
9	265	$\frac{1}{4}$	24	1056	$\frac{1}{4}$
10	309	$\frac{1}{4}$	25	1115	$\frac{1}{4}$
11	355	$\frac{1}{4}$	26	1174	$\frac{1}{4}$
12	402	$\frac{1}{4}$	27	1234	$\frac{1}{4}$
13	450	$\frac{1}{4}$	28	1294	$\frac{1}{4}$
14	500	$\frac{1}{4}$	29	1354	$\frac{1}{4}$
15	552	$\frac{1}{4}$	30	1414	$\frac{1}{4}$

Il partitore di questa tauola si è

2828 $\frac{1}{2}$

Il modo di misurare ogni cumulo di grano, & prima del tondo.


Sel cumulo sarà tondo, cio è che non tochi muro alcuno, facilmente si misurara, se prima fabricarai vna bachetta di legno quadra, & longa al meno pie 6, la quale sia diuisa in spacij dopij à questo notato qua à canto: ma per che le misure

de grani in alcun luogo sono piu grandi, & in altri piu picciole, fara in tua liberta di poter crescere, & scemare questi spacij, infino che vedrai che vno spacio interiore ti dia vno staro in quadratura. Dopo con questa bachetta misura il diametro del cumulo; il quale se fara 100 multiplica 10, in se fa 1000 & di nuouo 100 fia 11 fa 1100, poi parti per 14, ne ritesse 78 $\frac{2}{7}$, trouara la base del cumulo, misura l'altezza, laquale mi imagino che sia 7 spacij: pero multiplica 78 $\frac{2}{7}$ per 7, ne ritesse 550, il quale partito per terzo, fa 183 $\frac{1}{3}$ & tanti stara dico che farano nel cumulo tondo.

Se'l cumulo fara acosto ad vno sol muro, & sia mezo tondo, dirai che non sono che stara 91 $\frac{1}{2}$. Se fara acosto à due muri i quali facciano l'angolo retto, farano stara 45 $\frac{1}{2}$.

Del cumulo longo appoggiato ad vno sol muro.

Et prima de la regola ti do la sua figura, accio meglio intendi il mio parlare.




Rasettato che hauerai bene il cumulo con la palla, alhora misura con la sudetta bachetta il mezo diametro AB: dopo misura l'altezza EB, & suputa questi due numeri come di prima facesti, per che queste due parti cio è AEG & DFH altro non sono che vno quarto del cumulo tondo.

La parte poi EF & GH la quale è longa & di figura ferratile, si misura l'altezza acosto al muro, cio è BE la quale mi imagino per hora che sia 6, spacij de la bachetta: Dopo si misura il piano del pauimento BG, il quale essendo 8, multiplica 6 fia 8, fa 48, la cui mita fara 24: pero multiplica 24 per la longezza EF la quale sia per hora spacij 36 fara 864, & tanti stara di grano dico che farano in quello cumulo longo.

Del


Del cumulo longo che non si appoggia al muro.

Quando il cumulo fara longo con li due mezi circoli di qua è da la, come ti dimostra qua sotto la sua base,



Alhora misura i due mezi circoli de le cime al modo suddetto de cumuli tondi ò circolari, cio è la parte *L M N O* del restante cio è *M N* misurarai la sua altezza di mezo, la quale se fara 6, & il piano ò sia base al trauerso sia 18, multiplica 6 fia 9, che è la mita di 18, fa 54, liquali multiplica con la longezza di detta base *M N* restante, la quale essendo 36, multiplica 54 fia 36, fa 1944. Et tanti stara di grano farano nel cumulo longo. Ma nota che bisogna che i cumuli siano bene assetati prima che misurarli.

La seconda faccia del planispherio.




L'vso de la seconda faccia del planispherio, Et prima il modo di descriuere vno paese.

Di sopra ti promessi datti l'vso de la seconda faccia del planispherio, del quale sono infiniti gl'vsi, si in cose di Geometria, come d'Astronomia, & guerra: ma per hora non voglio far tanta digressione, forse vn' altro giornò ne parlaro in vno trattato de pesi, & vasi hydraulici: per hora diro solo l'vso di descriuere con esso vno paese, il quale si fa così. Sali sopra qualche torre di detto paese che tu voi descriuere, dopo situato il tuo instrumento orizzontalmente sopra detta torre, in luogo che tu possi vedere le città circonuicine, lo fissarai con tal arte che la calamita stia sopra la linea meridiana, all'hora girarai la alidada o p al dritto di vna di esse città che voi descriuere: come in esempio. Se volesti descriuere il Piemonte, & fosti sopra la torre di Sauigliano con il tuo instrumento situato al modo sudetto, girando la alidada verso Cuneo, vedrai per i buchi di essa la detta terra, che è di ponto in mezzo giorno, dopo girandò la alidada verso leuante, trouarai Fossano à gradi 32, innanzi mezzo giorno: similmente giratola piu verso leuante trouarai Ceruere di Ponto nel tuo oriente. Girata poi l'alidada vedrai Caramagnola di ponto à meza notte, & finalmente trouarai Salucio à gradi 10, innanzi l'ocaso: per il che ti bisogna notare sopra vna carta tutti questi numeri: fatto cio andarai à Fossano, doue salita la torre farai il simile, come festi à Sauigliano, & per esempio trouarai Sauigliano à gradi 30, innanzi meza notte, Salucio à gradi 14, dopo l'ocaso, Cuneo à gradi 15, dopo mezzo giorno, Ceruere à gradi 20, dopo meza notte, Caramagnola à gradi 8, innanzi meza notte: & similmente noterai questi numeri ne la tua carta. Dopo fabricarai vno picciolo instrumento di carta, partito similmente il suo circolo in 360 parti al modo astronomico, & metèdo questo fisso sopra la carta che voi descriuere il paese, & nel luogo doue ti pare che stia meglio Sauigliano: Dopo descriuerai tutte le linee di grado, in grado che tu notasti in Sauigliano, poi ti bisogna hauere la distàzia certa de migli da Sauigliano à Fossano, fatta prima la scalla di 10, ò vero 5, miglia sopra la carta, caminarai poi col sesto sopra la linea di Fossano, infino à tanto che tu troui la


sua

sua distanza da Sauigliano, & quiui piantato similmente il picciolo strumento di carta descriuerai tutte le linee notate in Fossano. Et doue le linee di Sauigliano trauerfarano quelle di Fossano, quiui descriuerai le tue città, ville, & castelli: come ti dimostra la presente figura, la quale io non ti do per cosa certa, per che non sono stato sopra il luogo di Sauigliano, ne Fossano, ne altri col strumento: ma l'aporto così per esempio, accio da esso possi meglio intendere quello che io ti dico, & dimostro con questa figura seguente.



*Altro modo di deſcrinere vno paëſe faciliffimo,
ſenza l'inſtrumento.*

Prima compartirai ſopra vno angolo de la carta la ſcalla de migli, come queſta.



Dopo nota qualche citta, ò borgo de le prime di quel paëſe, ne le eſtremita de la tua carta, come farebbe Cuneo in Piemonte, per eſſer piu vicino à monti: ti biſogna poi hauere cinque, ò ſei perſone pratiche del paëſe, à quali domanderai le diſtanzie di terra in terra, cominciando da la prima terra che hai notata, cio è Cuneo il quale è diſcoſto dal Mondeui 10 miglia verſo Occidente: & nota che ſempre ti biſogna hauer l'animo intento, da qual parte del Mondo ſia ſituata la terra che domandi. Coſi notata la prima diſtanza da Cuneo al Mondeui, domanderai quanti miglia ſono da Cuneo à Foſſano, & da Foſſano al Mondeui, le qual diſtanzie ſono di 10 miglia, la prima verſo meza notte, la ſeconda verſo mezo di, & cauando col ſeſto le diſtanzie di eſſe citta da la ſcalla, con quella iſteſſa apertura di ſeſto le deſcriuerai ſopra la tua tauola: come vedi qua. Et ſimile farai del reſto.



Il modo

*il modo di cauare la pianta d'vna città,
ò possessione.*

Prima farai fabricare vno instrumento di legno ben dritto, come ti dimostra la seguente figura *A B C*, che sia fondato nel centro *B* con tal arte che le due rigge *A C* possino liberamente aprirsi, & chiudersi, & nota che bisogna che qual si voglia di esse rigge *A C* siano longe almeno palmi sei, in sette. Dopo ne farai fabricare vn'altro picciolo, longo vno palmo per ogni lato, che habbi similmente l'vno pezzo inestato nel altro, & che possi aprirsi, & chiudersi al modo suddetto: come vedi qua in figura.



Fatti gli due instrumenti, se vorrai designare la pianta d'vna città, cominciarai da vno de angoli di essa, & aprendo prima l'instrumento piu grande, lo acostarai à detto angolo con tal arte che le rigge tochino ambidue i muri di esso angolo: dopo metti il picciolo instrumento nel primo, in modo che stia aperto, & acosto al grande, & formi il medemo angolo che formaua il grande: poi riportato esso picciolo instrumento sopra la carta, senza aprirlo, ne chiuderlo piu di quanto è, descriuerai quello angolo sopra la carta: & se voi saper quanto longa bisogna che sia la prima linea, ti bisogna misurare quanti passa è la longezza di detta cortina, come in esempio se la fossi diece passa, formarai diece passa, ò vinti piccioli su la carta, al modo de la scala de migli gia detta, &

col sesto darai di longezza à la prima linea diece passa di quegli piccioli, facendo poi il simile al secondo, & tutti gl' altri angoli che sono atorno la citta: così tu hauerai cauata la pianta. Ma se vorrai poi sapere se la pianta è giusta, misura il longo & largo de la citta, per il che se il tuo disegno farà tanti passa piccioli, quanti grandi è la citta, hauerai operato bene. Et al simile si descriuono li campi.



TAVOLA DE LE COSE CHE

si contengono nel libro presente di
Geometria.

LIBRO PRIMO.

LIBRO SECONDO.

<i>Che cosa sia Geometria.</i> Pag. 65	<i>De le superficie triangolare dette</i>
<i>Che cosa sia ponto.</i> 65	<i>isofcele.</i> 91
<i>Che cosa sia linea.</i> 66	<i>Del triangolo scaleno.</i> 91
<i>Che cosa sia angolo.</i> 67	<i>Del triangolo osionio.</i> 92
<i>Che cosa sia superficie.</i> 68	<i>Del triangolo osionio isofcele.</i>
<i>De corpi regulari, & irregolari.</i>	93
71, 72	<i>Del osionio scaleno.</i> 93
<i>De le misure antiche, & pie Ro-</i>	<i>De i triangoli ambilioni.</i> 93
<i>mano.</i> 72	<i>Modo di misurare le superficie qua-</i>
<i>Del planispherio Geometrico.</i> 74	<i>drate.</i> 93
<i>Prima faccia del planispherio.</i> 75	<i>Modo di misurare il quadrangolo.</i>
<i>De la seconda faccia del planisphe-</i>	94
<i>rio.</i> 75	<i>Modo di misurare il rombo.</i> 95
<i>Modo di misurare le linee rette ste-</i>	<i>De la misura del romboide.</i> 96
<i>se sopra un piano.</i> 76	<i>De le superficie trapezie, & loro</i>
<i>I termini che si usano ne le distan-</i>	<i>misure.</i> 96
<i>zie grandi.</i> 77	<i>De le figure poligonie, & loro mi-</i>
<i>il modo di misurare una linea retta</i>	<i>sura.</i> 98
<i>stesa sopra un piano al trauerso.</i>	<i>De la figura circolare, & sue misu-</i>
78	<i>re.</i> 99
<i>Modo di misurare le linee rette, che</i>	<i>Come dal numero de l'area si possa</i>
<i>salgono in alto, come torri.</i> 80	<i>saper il diametro.</i> 100
<i>Termini da usare ne le distanzie</i>	<i>Del mezzo circolo, & sue misure.</i>
<i>magiori de le torri.</i> 81	100
<i>Modo di misurare le linee perpen-</i>	<i>Modo di descriuere atorno ad vno</i>
<i>diculare, come profondita de</i>	<i>circolo, vno triangolo equilatero.</i>
<i>pozzi.</i> 81	101
<i>Modo di misurare la larghezza, &</i>	<i>Modo di formare vno triangolo</i>
<i>profondita di vno fosso.</i> 82	<i>uguale al quadrato.</i> 102
<i>Modo di partir vna linea in piu par-</i>	<i>Modo di fare d'vno triangolo, vno</i>
<i>ti con prestezza.</i> 88	<i>quadrato uguale a quello.</i> 102
<i>Modo di ridurre due linee rette in</i>	<i>Modo di fare d'vno quadrangolo vno</i>
<i>squadra.</i> 89	<i>quadrato uguale a quello.</i> 102

Modo di due quadrati, farne uno uguale à quegli. 103
 Modo di triplicare uno quadrato. l'uso astronomico. 112

104

Altro modo piu copioso. 104

Modo di uno hexagono, farne uno quadrato uguale à quello. 105

Modo di quadrare il pentagono. 105

Modo di fare uno circolo uguale al quadrato. 105

Modo di trouare il centro d'una parte del circolo. 106

Come si troui il circolo d'una superficie circolare. 106

Come si descriva uno circolo attorno à qual si voglia triangolo. 107

Modo di descrivere dentro, e fuori del circolo uno quadrato. 107

Modo di partir il circolo in otto, e sedeci parti. 108

Come si parte il circolo in tre, sei, nove, e dodici parti. 108

Modo di formare l'heptagono. 109

Modo di formare la superficie pentagono. 109

Come si descrine il circolo attorno al pentagono. 110

Come si parte il circolo in dieci, e quindici parti. 110

Come si habbino à governare quelli che misurano i seni su le volte.

110

Modo di formare la figura ouale.

LIBRO TERZO.

Modo di misurare i cubi. 113

Le misure de colonne tōde & triangolari. 114

Modo di misurar le piramide rotonde. 115

Modo di misurar le piramide quadrate. 115

Come si misuri uno corpo spherico. 116

Modo di duplicare ò triplicare uno corpo spherico, come balle d'artellaria. 116

Con qual arte si formino le picciole balle da ginoco. 117

Come si formi la stampa de baloni grandi. 118

De le misure & pesi antiqui. 119

De le misure de botte da vino. 120

Figura de la sua bachetta. 121

Modo di misurar i scemi. 124

Il modo di misurare ogni cumulo di grano. 125

Il modo di descrivere uno paese col planispherio. 128

Altro modo piu facile senza l'instrumento. 130

Modo di cauar la pianta d'una città ò possessione. 131









